Инструкция по применению
Диазолин-Озон Таблетки 50 мг 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мебгидролин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

таблетки от белого до белого с кремоватым или зеленоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской с двух сторон и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Мебгидролин

Состав

Каждая таблетка 50 мг содержит активного вещества: диазолин (мебгидролина нападизилат) 50 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) -34,5 мг, крахмал кукурузный - 10,0 мг, повидон -К17 -3,5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 1,0 мг, магния стеарат -1,0 мг. Каждая таблетка 100 мг содержит активного вещества: диазолин (мебгидролина нападизилат) 100 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный)-69,0 мг, крахмал кукурузный - 20,0 мг, повидон -К17 -7,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 2,0 мг, магния стеарат -2,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность колеблется в пределах 40-60 %. Период полувыведения из плазмы около 4 часов. Препарат практически не проникает через гематоэнцефалический барьер, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.

Показания

Сенная лихорадка, аллергический ринит, поллиноз, крапивница, отек Квинке, пищевая и лекарственная аллергия, дерматозы, сопровождающиеся кожным зудом (экзема, нейродермит и т.д.), конъюнктивит, кожная реакция после укуса насекомых.

Способ применения и дозы

Диазолин назначают внутрь после еды. Взрослым и детям с 12 лет по 0,05-0,1 г 1-2 раза в день, детям с 3 лет по 0,05 г 1 - 2 раза в день, с 5 лет по 0,05 г 2 - 3 раза в день. Высшие дозы для взрослых: разовая - 0,3 г, суточная - 0,6 г. Курс лечения назначается врачом и определяется характером заболевания и достигнутым терапевтическим эффектом.

Противопоказания

Гиперчувствительность, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, другие воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пилоростеноз, эпилепсия, нарушения сердечного ритма (обладая ваголитическим действием, может улучшать AV проводимость и способствовать развитию наджелудочковых аритмий). Беременность, период лактации. Детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано принимать в период беременности и лактации.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, проявляющееся диспептическими явлениями (изжога, тошнота, боли в эпигастральной области и др.). Со стороны нервной системы: головокружение, парестезии, тремор, повышенная утомляемость, сонливость, тревожность (по ночам), замедление скорости реакции. Прочие: сухость во рту, нарушения мочеиспускания, аллергические реакции. Крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза. У детей - парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, раздражительность, тремор, нарушения сна.

Передозировка

Симптомы: угнетение или возбуждение (особенно у детей) функций центральной нервной системы, депрессия, спутанность сознания. Расширение зрачков, сухость во рту, затрудненное дыхание, покраснение лица, парез органов желудочно-кишечного тракта, у детей - развитие судорог и летальный исход. Лечение: специфического антидота нет. Индукция рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия включает препараты, повышающие артериальное давление, кислород, введение плазмозамещающих жидкостей внутривенно. Тщательный контроль за дыханием и уровнем артериального давления. Нельзя использовать адреналин и аналептики.

Взаимодействие с другими препаратами

Потенцирует действие алкоголя и лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Особые указания

Малоэффективен при бронхиальной астме и анафилактическом шоке.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (вождение автомобиля и др.).

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25гр.С. Хранить в недоступном для детей месте.