Инструкция по применению
Дибазол Таблетки 20 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бендазол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 20 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бендазол

Состав

Бендазол 20 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Спазмолитическое средство миотропного действия, производное бензимидазола. Оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов. Понижает АД за счет уменьшения сердечного выброса и расширения периферических сосудов. Гипотензивная активность бендазола весьма умеренна, а эффект непродолжителен.Вызывает непродолжительное расширение мозговых сосудов.Облегчает синаптическую передачу в спинном мозге. Иммуностимулирующая активность связана с регуляцией соотношения концентраций цГМФ и цАМФ в иммунных клетках (повышает содержание цГМФ), что приводит к пролиферации зрелых сенсибилизированных Т- и В-лимфоцитов, секреции ими факторов взаимного регулирования, кооперативной реакции и активации конечной эффекторной функции клеток.

Показания

Артериальная гипертензия, гипертонический криз. Спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов (в т.ч. желудка, кишечника). Остаточные явления полиомиелита, периферического паралича лицевого нерва.

Способ применения и дозы

Купирование гипертонического криза - в/в или в/м 30-40 мг. Обострение течения артериальной гипертензии со значительным повышением АД - в/м по 20-30 мг 2-3 раза/сут, курс лечения 8-14 дней. Внутрь - по 20-50 мг 2-3 раза/сут 3-4 недели. При лечении нервных болезней - взрослым в дозе 5 мг 1 раз/сут или через день в течение 5-10 дней, через 3-4 недели курс лечения повторяют. В дальнейшем курсы проводят с перерывом 1-2 мес. Для детей в зависимости от возраста доза составляет 1-5 мг 1 раз /сут.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бендазолу.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции. При длительном применении: ухудшение показателей ЭКГ в связи с уменьшением сердечного выброса. При применении в высоких дозах: чувство жара, повышенное потоотделение, головокружение, тошнота, головная боль.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с антигипертензивными средствами, диуретиками возможно усиление антигипертензивного действия.Одновременный прием бендазола предупреждает обусловленное бета-адреноблокаторами увеличение ОПСС.При одновременном применении фентоламин усиливает гипотензивное действие бендазола.

Условия хранения

В сухом месте