Инструкция по применению
Дибазол-УБФ Таблетки 20 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Уралбиофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бендазол
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки белого или белого со слегка сероватым или желтоватым оттенком цвета, круглой плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Действующее вещество

Бендазол

Состав

1 таблетка содержит: Действующие вещества: бендазола гидрохлорид - 20 мг
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 192 мг, крахмал картофельный - 38 мг, кальция стеарат - 3 мг, повидон К17 - 5 мг, тальк - 2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Исследования не проводились.

Показания

Дибазол-УБФ применяют в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении артериальной гипертензии у взрослых пациентов.

Способ применения и дозы

Взрослые - по 20-50 мг 2-3 раза в сутки в течение 3-4 недель или более короткими курсами. Применяют внутрь за 2 часа до еды или через 2 часа после еды. Пожилой возраст. Безопасность и эффективность применения бендазола у пациентов пожилого возраста при длительном лечении артериальной гипертензии не установлены. Данные отсутствуют. Пациенты с нарушением функции почек и (или) печени. Безопасность и эффективность применения бендазола у пациентов с нарушением функции почек и (или) печени не установлены. Данные отсутствуют. Дети. Безопасность и эффективность применения бендазола у детей в возрасте до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бендазолу и другим компонентам препарата. Заболевания, протекающие с повышенным мышечным тонусом - судорожный синдром. Детский возраст до 18 лет. Беременность. Период грудного вскармливания. Редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение при беременности и кормлении грудью

Поскольку данные о безопасности препарата для плода отсутствуют, его нельзя применять в период беременности. В период грудного вскармливания, при необходимости применения препарата Дибазол-УБФ, следует прекратить кормление грудью на время лечения препаратом.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, легкая головная боль, ощущение жара. Нарушения со стороны сосудов: снижение артериального давления. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: повышенное потоотделение. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Необходимо немедленно обратиться к врачу при передозировке препарата. Симптомы: сведения о случаях передозировки отсутствуют. Наиболее вероятным нежелательным явлением может быть выраженное снижение артериального давления. Лечение: при выраженном снижении артериального давления придать пациенту положение лежа с приподнятыми нижними конечностями, проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Антигипертензивное действие бендазола усиливается при одновременном применении его с антигипертензивными препаратами других фармакотерапевтических групп и диуретическими средствами. Бендазол предупреждает обусловленное бета-адреноблокаторами увеличение общего периферического сосудистого сопротивления. Фентоламин усиливает антигипертензивное действие бендазола.

Особые указания

Не рекомендуется назначать для длительного лечения артериальной гипертензии, особенно пациентам пожилого возраста, так как гипотензивный эффект связан с уменьшением сердечного выброса и возможно ухудшение показателей электрокардиограммы. Эффективность и безопасность приема бендазола внутрь для купирования гипертонического криза не изучены, в связи с чем не следует применять препарат Дибазол-УБФ как средство экстренной помощи при гипертоническом кризе. Вспомогательные вещества. Препарат Дибазол-УБФ содержит лактозы моногидрат (сахар молочный). Пациентам с редко встречающимися наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, непереносимость лактозы вследствие дефицита лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, не следует принимать данный лекарственный препарат. Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применения препарата. Следует обратиться к врачу в случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения не рекомендуется управление транспортными средствами, а также занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.