
Инструкция по применению
Дибикор Таблетки 500 мг 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Таурин
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Действующее вещество

Таурин

Состав

Действующим веществом препарата является таурин. Каждая таблетка содержит 500 мг таурина. Прочие ингредиенты (вспомогательные вещества): целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, желатин, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Дибикор®, таблетки, показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения: сахарного диабета 2 типа, в том числе и с умеренной гиперхолестеринемией; сахарного диабета 1 типа; сердечно-сосудистой недостаточности различной этиологии; интоксикации, вызванной сердечными гликозидами; в качестве гепатопротектора у пациентов, принимающих противогрибковые препараты. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу

Способ применения и дозы

Всегда принимайте лекарственный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. При сахарном диабете 2 типа, в том числе с умеренной гиперхолестеринемией: по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в монотерапии или в сочетании с другими гипогликемическими средствами для приема внутрь, длительность курса – по рекомендации врача. При сахарном диабете 1 типа: по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в сочетании с инсулинотерапией в течение 3–6 месяцев. При сердечно-сосудистой недостаточности: по 250–500 мг (?–1 таблетка) 2 раза в сутки, курс лечения – 30 дней. Доза может быть увеличена до 2–3 г (4–6 таблеток) в сутки. При интоксикации сердечными гликозидами: не менее 750 мг (1,5 таблетки) в сутки. В качестве гепатопротектора: по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение всего курса приема противогрибковых препаратов. Способ применения Препарат принимается внутрь, за 20 минут до еды. Если Вы забыли принять препарат Дибикор® Если Вы забыли принять препарат в нужное время, следуйте своему обычному графику дозирования, приняв следующую дозу в назначенное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Дибикор®, таблетки, если у Вас: аллергия на действующее вещество (таурин) или любое из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша; детский возраст до 18 лет (отсутствуют систематизированные данные о применении). Если у Вас одно из перечисленных состояний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не рекомендуется применение препарата Дибикор® во время беременности в связи с отсутствием опыта клинического применения у данной категории пациентов. Грудное вскармливание Не рекомендуется применение препарата Дибикор® в период грудного вскармливания в связи с отсутствием опыта клинического применения у данной категории пациентов.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, Дибикор® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно): аллергические реакции. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через сайт www.pikfarma.ru или в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарат Дибикор® больше, чем следовало Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Дибикор® может применяться с другими лекарственными средствами; усиливает инотропный эффект (усиление сердечных сокращений) сердечных гликозидов.

Особые указания

Перед приемом препарата Дибикор® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. На фоне приема препарата Дибикор® следует уменьшать дозу сердечных гликозидов иногда в 2 раза, в зависимости от чувствительности пациентов к сердечным гликозидам. Это же правило относится к блокаторам « медленных» кальциевых каналов. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания обратитесь к врачу. Не превышайте максимальные сроки и рекомендованные дозы препарата без согласования с врачом. Дети и подростки Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, так как его безопасность и эффективность в этой возрастной группе не установлены.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.