Инструкция по применению
Дибикор Таблетки 250 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Таурин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Таурин

Состав

Активное вещество: таурин 250 мг вспомогательные вещества: МКЦ - 23 мг, крахмал картофельный - 18 мг, желатин - 6 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 0,3 мг, кальция стеарат - 2,7 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Сердечно-сосудистая недостаточность различной этиологии.Интоксикация, вызванная сердечными гликозидами.Сахарный диабет типа 1.Сахарный диабет типа 2, в т.ч. С умеренной гиперхолестеринемией.

Способ применения и дозы

Дибикор принимаютВнутрь, за 20 мин до еды.При сердечной недостаточности - 250-500 мг 2 раза в день, курс лечения - 30 дней. Доза может быть увеличена до 2-3 г/сут или уменьшена до 125 мг на прием.При сахарном диабете типа 2 - по 500 мг 2 раза в день в качестве монотерапии или в сочетании с таблетированными сахароснижающими средствами.При диабете типа 1 - по 500 мг 2 раза в день в сочетании с инсулинотерапией в течение 3-6 мес.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата Дибикор.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Дибикор может применяться с другими лекарственными средствами; усиливает инотропный эффект сердечных гликозидов.

Особые указания

На фоне приема препарата Дибикор следует уменьшать дозу сердечных гликозидов иногда в 2 раза, в зависимости от чувствительности пациентов к сердечным гликозидам. Это же правило относится к блокаторам медленных кальциевых каналов.

Условия хранения

В сухом месте