Инструкция по применению
Дибикор Таблетки 500 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Таурин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Таурин

Состав

Действующее вещество: ТауринВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 46 мг, крахмал картофельный 36 мг, желатин 12 мг, кремния диоксид коллоидный (Аэросил) 0,6 мг, кальция стеарат 5,4 мг.Концентрация действующего вещества (мг): 500 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После однократного приема 500 мг таурин через 15-20 мин определяется в крови, достигая Cmax через 1.5-2 ч. Полностью препарат выводится через сутки.

Показания

сердечно-сосудистая недостаточность различной этиологии;интоксикация, вызванная сердечными гликозидами;сахарный диабет 1 типа;сахарный диабет 2 типа, в том числе и с умеренной гиперхолестеринемией;в качестве гепатопротектора у пациентов, принимающих противогрибковые препараты.

Способ применения и дозы

При сердечной недостаточности Дибикор принимают внутрь по 250-500 мг (1/2 - 1 таблетка) 2 раза в день за 20 минут до еды, курс лечения - 30 дней. Доза может быть увеличена до 2-3 г (4-6 таблеток) в сутки.При интоксикации сердечными гликозидами - не менее 750 мг (1,5 таблетки) в сутки.При сахарном диабете 1 типа - по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в день в сочетании с инсулинотерапией в течение 3-6 месяцев.При сахарном диабете 2 типа - по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в день в монотерапии или в сочетании с другими гипогликемическими средствами для приема внутрь.При сахарном диабете 2 типа, в том числе с умеренной гиперхолестеринемией - по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки, длительность курса - по рекомендации врача.В качестве гепатопротектора - по 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение всего курса приема противогрибковых препаратов.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препарату;Дибикор не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 18 лет в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности.Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Дибикор может применяться с другими лекарственными средствами; усиливает инотропный эффект сердечных гликозидов.

Особые указания

На фоне приема препарата Дибикор следует уменьшать дозу сердечных гликозидов иногда в 2 раза, в зависимости от чувствительности пациентов к сердечным гликозидам. Это же правило относится к блокаторам медленных кальциевых каналов.

Условия хранения

В сухом месте