# Инструкция по применению
# Дицетел Таблетки покрытые оболочкой 100 мг 20 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пинаверия бромид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60

## Действующее вещество

Пинаверия бромид

## Состав

Действующее вещество: Пинаверия бромидКонцентрация действующего вещества (мг): 100 мг

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

При приеме внутрь абсорбируется из ЖКТ менее 10%. Cmax достигается через 1 ч. Связывание с белками плазмы составляет 97%. Метаболизируется в печени. T1/2 - 1.5 ч. Выводится с калом, незначительная часть - почками.

## Показания

- Симптоматическое лечение болей, нарушений транзита кишечного содержимого и дискомфорта, связанных с функциональными расстройствами работы кишечника;- Симптоматическое лечение болей, связанных с функциональными расстройствами желчевыводящих путей;- Подготовка к рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного тракта с применением бария сульфата.

**Способ применения и дозы**

Препарат предназначен для приема внутрь.Таблетки принимают во время еды целиком, не разжевывая и не рассасывая, запивая стаканом воды, чтобы предотвратить контакт пинаверия бромида со слизистой оболочкой пищевода (см. раздел «Особые указания»). Дицетел, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг. Рекомендуемая суточная доза - по 1 таблетке 3 раза в день или по 2 таблетки 2 раза в день.Если необходимо, суточная доза может быть увеличена до 2 таблеток 3 раза в день.При подготовке к рентгенологическому исследованию - по 2 таблетки 2 раза в день в течение 3 дней перед исследованием.Дицетел, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг. Рекомендуемая суточная доза - по 1 таблетке 2 раза в день.Если необходимо, суточная доза может быть увеличена до 1 таблетки 3 раза в день. При подготовке к рентгенологическому исследованию - по 1 таблетке 2 раза в день в течение 3 дней перед исследованием.

**Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.- Дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. В связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности применение препарата у детей до 18 лет не рекомендовано.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) пинаверия бромид применяют с осторожностью, только в случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

**Побочные действия**

Во время постмаркетингового применения сообщалось о следующих нежелательных явлениях. Сообщения носили спонтанный характер, и для точной оценки частоты случаев имеющихся данных недостаточно. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: Боль в области живота, диарея, тошнота, рвота, дисфагия.При неправильном приеме препарата возможно повреждение слизистой оболочкипищевода (см. раздел «Особые указания»).Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:Сыпь, зуд, крапивница, эритема.Нарушения со стороны иммунной системы:Гиперчувствительность.

**Передозировка**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

**Особые указания**

Не следует принимать перед сном. С осторожностью применяют у детей.

**Условия хранения**

В сухом месте