Инструкция по применению
Дифертон Таблетки покрытые оболочкой массой 1,43 г 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Негормональный комплекс с инозитом. Содержит мио-инозитол и D-хиро-инозитол в естественном соотношении 40:1. Усилен активными компонентами для комплексного влияния на обмен веществ. Предназначен для нормализации цикла при синдроме поликистозных яичников. Способствует облегчению метаболического синдрома. Помогает восстановить естественный гормональный баланс. Кому применять? Дифертон содержит компоненты, которые помогают нормализовать как работу яичников, так и обмен веществ, в частности, усвоение глюкозы. Поэтому прием Дифертона будет полезен: женщинам с синдромом поликистозных яичников, при нарушенной чувствительности к инсулину (метаболическом синдроме). Оптимальная длительность приема составляет 3-6 месяцев. Действие компонентов: Мио-инозитол + D-хиро-инозитол: Нормализуют работу яичников и процессы овуляции, улучшают качество яйцеклеток, чем способствуют восстановлению регулярного цикла. Также помогают стабилизировать выработку инсулина, снижая тяжесть метаболического синдрома. Альфа-липоевая кислота: Помогает клеткам восстановить чувствительность к инсулину, улучшает усвоение глюкозы, что в итоге способствует нормализации гормонального баланса. Требуется для правильного развития фолликулов. Фолиевая кислота + витамин D3 + марганец: При курсовом приеме нормализуют обмен веществ и общее состояние. Важно! У 70 % женщин с синдромом поликистозных яичников диагностируют нарушение усвоения глюкозы и чувствительность к инсулину (метаболический синдром). Метаболический синдром связан с повышенной выработкой инсулина, что нарушает нормальный гормональный баланс. В результате возникают сбои в работе репродуктивной системы и снижается вероятность беременности. Поэтому при метаболическом синдроме необходима поддержка и защита женской репродуктивной системы. Почему инозит полезен при синдроме поликистозных яичников: Инозит - это витаминоподобное вещество. Биологической активностью обладают две формы - мио-инозитол и D-хиро-инозитол. В плазме крови человека они содержатся в соотношении 40:1. Мио-инозитол в организме превращается в D-хиро-инозитол, который требуется для нормального усвоения глюкозы и в то же время улучшает состояние тканей яичников, способствует правильному формированию фолликулов и выходу яйцеклетки наружу. Однако при нарушенном инсулиновом обмене мио-инозитол не может превратиться в D-хиро-инозитол, и в яичниках возникает дефицит этого вещества, что ведет к ненаступлению овуляции и появлению кист. Прием двух форм инозита в естественном соотношении для организма эффективно устраняет их дефицит и помогает восстановить овуляцию, регулярный цикл и уменьшить тяжесть метаболического синдрома.

Состав

Носитель - микрокристаллическая целлюлоза (E460i), инозит (сумма мио-инозитола и D-хиро-инозитола), мальтодекстрин, альфа-липоевая кислота, стабилизатор - гидроксипропилметилцеллюлоза (E464), марганца глюконат, антислеживающие агенты - магниевая соль стеариновой кислоты (E470), диоксид кремния аморфный (E551), стабилизаторы - кроскарамеллоза натрия (E468), полиэтиленгликоль (E1521), агент антислеживающий - тальк (E553), холекальциферол, фолиевая кислота. Количество в 2 таблетках: Инозит - 1127,6 мг Мио-инозитол - 1100 мг D-хиро-инозитол - 27, 6 м Альфа-липоевая кислота - 75 мг Витамин D3 - 10 мкг Фолиевая кислота - 600 мкг Марганец - 5 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника инозита (B8), альфа-липоевой кислоты, фолиевой кислоты, витамина D3 и марганца. Женщинам с синдромом поликистозных яичников, При нарушенной чувствительности к инсулину (метаболическом синдроме).

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 30 дней. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Взаимодействие с другими препаратами

Дипептивен можно смешивать с растворами аминокислот, строго соблюдая правила асептики. При смешивании с раствором-носителем необходимо убедиться в совместимости растворов и обеспечить полное смешивание. Не следует добавлять в смесь другие лекарственные средства.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.