Инструкция по применению
Дифферин® гель для наружного применения 0,1%, 30г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Франция
Производитель: Галдерма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Адапален
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 3 года. Не использовать после истечения срока годности.



Описание

Дифферин® гель — препарат для лечения угревой сыпи (акне) легкой и средней степени тяжести, в том числе при наличии комедонов, папул и пустул. Гель от акне и прыщей на лице действует на причины возникновения акне и оказывает комплексный эффект: • Препарат от угрей и черных точек воздействует на комедоны и предотвращает появление новых высыпаний (уменьшает образование микрокомедонов); • Компоненты геля от прыщей обладают комедонолитической и противоспалительной активностью; • Средство от прыщей на лице не является антибиотиком, поэтому не вызывает резистентности у Cutibacterium acnes; • Клиническое улучшение развивается после 4-8 недель лечения, стойкое улучшение после 3-месячного курса лечения. Дифферин® гель от комедонов и акне следует наносить тонким слоем на пораженные угревой сыпью участки кожи 1 раз/сут перед сном на чистую сухую кожу, избегая попадания препарата в глаза, на губы, слизистые оболочки и уголки носа. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Не замораживать.

Действующее вещество

Адапален

Состав

1 г геля содержит: Действующее вещество: Адапален – 1,0 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 40,0 мг, метилпарагидроксибензоат – 1,0 мг, феноксиэтанол – 2,5 мг, карбомер 940Р – 11,0 мг, динатрия эдетат – 1,0 мг, полоксамер 182 – 2,0 мг, натрия гидроксид – до pH 5,0 ± 0,15, вода очищенная – до 1 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Абсорбция адапалена через кожу очень низка (около 4 % применяемой дозы). Экскреция из организма происходит, главным образом, через желчь.

Показания

Угревая сыпь легкой и средней степени тяжести, в том числе при наличии комедонов, папул и пустул.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения. Гель следует наносить тонким слоем на пораженные угревой сыпью участки кожи 1 раз в сутки перед сном на чистую сухую кожу, избегая попадания геля в глаза, на губы, слизистые оболочки и уголки носа. Заметное клиническое улучшение развивается после 4–8 недель лечения, стойкое улучшение – после 3-х месячного курса лечения. Поскольку при лечении угревой сыпи принято чередование методов терапии, то через 3 месяца терапии препаратом рекомендуется проконсультироваться с врачом о дальнейшей терапии.

Противопоказания

• Повышенная чувствительность к адапалену или любому из вспомогательных веществ. • Детский возраст до 12 лет (эффективность и безопасность препарата для данной возрастной категории не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Клинический опыт наружного применения адапалена при беременности носит ограниченный характер, однако доступные данные у пациенток, получавших препарат на ранних сроках беременности, не свидетельствуют о его отрицательном влиянии на течение беременности или на здоровье плода. В связи с ограниченным характером имеющихся данных, а также вследствие возможности незначительного проникновения адапалена через кожу, препарат Дифферин® не следует применять во время беременности. В случае наступления беременности лечение следует прекратить. Период грудного вскармлиания. Исследование проникновения препарата в грудное молоко животных или человека после нанесения на кожу не проводилось. Поскольку системная экспозиция препарата Дифферин® у кормящих грудью женщин незначительная, не предполагается какого-либо воздействия на детей, находящихся на грудном вскармливании. Препарат Дифферин® можно применять в период грудного вскармливания. Во избежания контакта грудного ребёнка с препаратом при применении препарата Дифферин® в период грудного вскармливания следует избегать нанесения на область груди.

Побочные действия

Избыточное нанесение препарата на кожу не приведёт к более быстрому достижению результата или получению более выраженного эффекта, однако при этом может развиться покраснение, шелушение или дискомфорт. Гель Дифферин® предназначен только для наружного применения. При случайном проглатывании даже незначительного количества препарата следует промыть желудок, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Передозировка

Избыточное нанесение препарата на кожу не приведет к более быстрому достижению результата или получению более выраженного эффекта, однако при этом может развиться покраснение, шелушение или дискомфорт. Гель Дифферин® предназначен только для наружного применения. При случайном проглатывании даже незначительного количества препарата, следует промыть желудок, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Абсорбция адапалена через кожу является низкой, поэтому его взаимодействие с системными лекарственными препаратами маловероятно. Не установлено взаимодействий с другими лекарственными средствами, которые могут применяться наружно и одновременно с препаратом Дифферин®. При применении геля Дифферин® в вечернее время, утром можно применять такие препараты для наружного лечения угревой сыпи, как растворы эритромицина (до 4 %) или клиндамицина фосфата (1 % в пересчете на основание), или гели бензоила пероксида на водной основе (до 10 %), поскольку данные препараты не вызывают взаимной деградации или кумулятивного раздражения. Тем не менее, одновременно с адапаленом не следует применять другие ретиноиды или препараты со сходным механизмом действия. Одновременное применение препарата Дифферин® и средств для пилинга, абразивных очищающих средств, а также средств с подсушивающим, вяжущим или раздражающим действием (ароматических или спиртсодержащих средств) не рекомендуется.

Особые указания

При подозрении на развитие реакции повышенной чувствительности или тяжелой формы раздражения кожи следует прекратить применение препарата. В некоторых случаях, в зависимости от степени раздражения кожи, число нанесений может быть сокращено или лечение приостановлено до исчезновения признаков раздражения. Возобновление лечения возможно после консультации с врачом. Следует избегать попадания в глаза, рот, уголки носа и на слизистые оболочки. При случайном попадании препарата на слизистые оболочки глаз необходимо промыть их теплой водой. Препарат нельзя наносить на поврежденную в результате травмы (порезы или ссадины), солнечного ожога или экзематозную кожу. Для лечения узловатых и конглобатных акне тяжелой степени применяют системные антибактериальные препараты + адапален, бензоила пероксид или комбинацию адапален + бензоила пероксид. В этом случае адапален может применяться для лечения угревой сыпи на лице, груди или спине, под наблюдением врача. Однако не следует применять адапален в мототерапии у пациентов с тяжелой формой угревой сыпи на обширных участках кожи. Во избежание раздражения кожи при применении адапалена необходимо свести к минимуму воздействие солнечного света и искусственного ультрафиолетового облучения, включая лампы солнечного света и искусственного ультрафиолетового облучения, включая лампы солнечного света. Если избежать воздействия не представляется возможным, рекомендуется применение солнцезащитных средств и одежды для защиты обработанных препаратом участков кожи. При применении препарата Дифферин® возможно использование косметических средств, не обладающих комедогенными или вяжущими средствами. Гель Дифферин® содержит метилпарагидроксибензоат (E2018), который может вызывать аллергические реакции во время или после завершения лечения, и пропиленгликоль, который может оказывать раздражающее воздействие на кожу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.