Инструкция по применению
Диклофенак 1% Мазь 30 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диклофенак
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Описание

Мазь белого или почти белого цвета, со слабым характерным запахом, однородной консистенции.

Действующее вещество

Диклофенак

Состав

Одна туба содержит: действующее вещество: диклофенак натрия - 0,3 г, вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, макрогол тип 1500, макрогол тип 400.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При аппликации системная абсорбция составляет не более 6%. Связь с белками - 99.7%. Выводится почками. При нанесении на область поражения сустава концентрация в синовиальной жидкости выше, чем в плазме.

Показания

Боль в спине при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника (радикулит, остеоартроз, люмбаго, ишиас), боль в суставах (суставы пальцев рук, коленные и др.) при остеоартрозе, боль в мышцах (вследствие растяжений, перенапряжений, ушибов, травм), воспаление и отечность мягких тканей и суставов вследствие травм и при ревматических заболеваниях (тендовагинит, бурсит, поражение периартикулярных тканей, лучезапястный синдром). Препарат применяют для симптоматической терапии, на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 12 лет препарат наносят на кожу 2 раза в сутки (каждые 12 часов: желательно утром и вечером), слегка втирая в кожу. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. Разовая доза препарата - 2 - 4 г (что по объему сопоставимо соответственно с размерами вишни или грецкого ореха) достаточна для обработки зоны площадью 400-800 см. Суточная доза составляет 8 г. Если руки не являются зоной локализации боли, то после нанесения препарата их необходимо вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта. Препарат не следует применять более 14 дней при посттравматических воспалениях и ревматических заболеваниях мягких тканей без рекомендации врача. Если через 7 дней применения терапевтический эффект не наблюдается или состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диклофенаку или другим компонентам препарата, склонность к возникновению приступов бронхиальной астмы, кожных высыпаний или острых ринитов при применении ацетилсалициловой кислоты или других НГГВП, беременность (III триместр), нарушение целостности кожных покровов в предполагаемом месте нанесения, детский возраст (до 12 лет), период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в I и II триместре возможно только в случае, если потенциальная польза для матери превышает риск для плода. Применение препарата в III триместре и лактации противопоказано.

Побочные действия

Нежелательные явления, представленные ниже, перечислены в зависимости от физиологической классификации и частоты встречаемости. Частота определяется по ВОЗ и имеет следующую градацию: "очень часто" (≥1/10) "часто" (≥1/100, Нарушения со стороны иммунной системы Очень редко: реакции гиперчувствительности (включая крапивницу), ангионевротический отек. Нарушения со стороны дыхательной системы Очень редко: бронхиальная астма. Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки Общие: сыпь, экзема, эритема, дерматит (в том числе контактный дерматит), зуд. Редко: буллезный дерматит. Очень редко: реакция фотосенсибилизации, пустулезная сыпь. Вероятность системных побочных эффектов при местном применении мази диклофенак мала по сравнению с частотой побочных эффектов при пероральном лечении диклофенаком натрия. При длительном применении мази на больших площадях кожных покровов в течение длительного периода времени, частота системных побочных эффектов не может быть полностью исключена. В таких случаях, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Передозировка

Ввиду низкой системной абсорбции при аппликации мази, передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Может усиливать действие лекарственных средств, вызывающих фотосенсибилизацию. С осторожностью использовать с другими лекарственными средствами, обладающими заведомо известной гепатоксичностью, например, антибиотиками, противоэпилептическими лекарственными средствами. Клинически значимое взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно, вследствие незначительной системной абсорбции.

Особые указания

Наносят только на неповрежденные участки кожи. После наложения не следует накладывать окклюзионную повязку. При длительном применении и/или нанесении на обширные поверхности возможно развитие системных побочных эффектов вследствие резорбтивного действия. Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки или открытые раны. Клинические испытания и эпидемиологические данные свидетельствуют о возможном небольшом повышении риска артериального тромбоза (например, инфаркт миокарда или инсульт) при использовании диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг в день) и при длительном лечении.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.