Инструкция по применению
Диклофенак капли глазные 0,1% 5мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Диклофенак
Количество в упаковке: 1



Описание

Глазные капли Диклофенак обладают противовоспалительным и обезболивающим действием.

Действующее вещество

Диклофенак

Состав

1 мл содержит диклофенак натрия 1 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид, пропиленгликоль, натрия дигидрофосфата дигидрат (натрий фосфорнокислый однозамещенный двуводный), динатрия гидрофосфат додекагидрат (натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный), динатрия эдетат, натрия гидроксид (1 М раствор, до pH 6.5-7.5), вода д/и.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Время достижения Cmax в роговице и в конъюнктиве -30 мин. После инстилляции, проникает в переднюю камеру глаза, в системном кровообращении в терапевтически значимых концентрациях не обнаруживается.

Показания

Ингибирование миоза во время операции по поводу катаракты, воспалительные процессы после хирургических вмешательств, профилактика кистоидного отека зрительного нерва до и после операции, связанной с удалением и имплантацией хрусталика, воспалительные процессы неинфекционной природы с вовлечением передних отделов глаза, посттравматическое воспаление после проникающих и непроникающих ранений глазного яблока, болевой синдром при проведении эксимерного лазерного вмешательства.

Способ применения и дозы

Местно. Закапывают в конъюнктивальный мешок до операции по 1 капле 5 раз в течение 3 ч с интервалом в 20-25 мин, сразу после операции - по 1 капле 3 раза, далее по 1 капле 3-5 раз/сут в течение необходимого времени, другие показания - 1 капля 4-5 раз/сут.

Противопоказания

III триместр беременности, детский возраст (до 2-х лет), повышенная чувствительность к НПВП и другим компонентам препарата. С осторожностью: "аспириновая" астма, эпителиальный герпетический кератит (в т.ч. в анамнезе), заболевания, вызывающие нарушения свертывания крови (в т.ч. гемофилия). Особую осторожность следует проявлять к больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также в связи с риском развития кровотечений у больных, получающих антикоагулянты, при беременности, в период лактации, пациентам детского возраста (старше 2-х лет), пожилым пациентам.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применение препарата оправдано, если потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Местные реакции: ощущение жжения в глазу, нечеткость зрительного восприятия (сразу после закапывания), помутнение роговицы (бельмо), ирит. Аллергические реакции: зуд в глазах, гиперемия конъюнктивы, ангионевротический отек лица, лихорадка, озноб, фотосенсибилизация, кожная сыпь (преимущественно эритематозная), крапивница. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

Передозировка

При применении глазных капель Диклофенак в рекомендованных дозах передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Интервал после применения глазных капель Диклофенак и других глазных капель должен составлять не менее 5 мин. При наличии клинических показаний можно комбинировать с глазными каплями, содержащими глюкокортикостероидные средства.

Особые указания

Сразу после закапывания может наступить нечеткость зрительного восприятия, что может привести к затруднению управления транспортом, (в т.ч. автомобилем), работе на высоте. Необходимо возобновить подобную деятельность лишь через 15 мин после введения препарата. Не разрешается ношение мягких контактных линз одновременно с введением препарата. Твердые контактные линзы должны быть удалены до закапывания и вновь установлены лишь спустя 20 мин после введения препарата.