Инструкция по применению
Диклоран® ПЛЮС Гель 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диклофенак
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Диклофенак

Состав

на 1 г геляАктивные вещества: Диклофенак диэтиламина 11,61 мг что эквивалентно диклофенаку натрия 10,0 мгЛьна посевного семян масло 30,0 мгЛевоментол 50,0 мгМетилсалицилат 100,0 мгвспомогательные вещества:Бутилгидроксианизол 0,20 мгБутилгидрокситолуол 2,0 мгБензиловый спирт 10,0 мклДинатрия эдетат 1,0 мгДиэтиламин 7,1 мклКарбомер 980. 10,8 мгЛимонной кислоты моногидрат 1,0 мгМакрогола глицерилгидроксистеарат (Кремофор RH-40) 35,0 мгПропиленгликоль 100,0 мгВода Ск. треб. до 1,0 гр

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При местном применении по инструкции диклофенак натрия, метилсалицилат и льняное масло всасываются и проникают в подкожную клетчатку, мышечную ткань и суставную капсулу.

Показания

заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит); ревматические поражения мягких тканей (тендовагинит, бурсит);мышечные боли ревматического и неревматического происхождения (вызванные, в том числе чрезмерными физическими нагрузками);посттравматическое воспаление мягких тканей и суставов (вследствие растяжений, перенапряжений и ушибов).

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 12 лет гель наносят на кожу 3-4 раза в сутки и слегка втирают. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. Разовая доза препарата ДИКЛОРАН ПЛЮС – 2-4 г (4-8 см при полностью открытой горловине тубы). Детям с 6 до 12 лет применять не чаще 2 раз в день, разовая доза препарата до 2 г. Продолжительность лечения без консультации врача не должна превышать 10 дней. Вопрос о возможности более длительного применения препарата врач решает индивидуально и дает пациенту дальнейшие инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диклофенаку, метилсалицилату или другим компонентам, входящим в состав препарата, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов (в т. ч. в анамнезе), беременность (III триместр), период лактации (грудное вскармливание), детский возраст (до 6 лет), нарушение целостности кожных покровов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан в III триместре беременности. Вопрос о применении препарата в I и II триместрах беременности решается индивидуально. Из-за отсутствия опыта применения ДИКЛОРАНА ПЛЮС в период лактации, применение препарата в данный период не рекомендуется.

Побочные действия

Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение). Системные реакции: генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспастические реакции).

Передозировка

При наружном применении в дозах, рекомендуемых инструкцией к ДИКЛОРАНУ ПЛЮС, крайне низкая системная абсорбция активных компонентов препарата делает передозировку практически невозможной. При случайном приеме внутрь возможно развитие системных побочных эффектов. Лечение при попадании внутрь: промывание желудка, индукция рвоты, прием активированного угля, форсированный диурез, симптоматическая терапия. Диализ неэффективен ввиду высокой степени связывания диклофенака с белками плазмы крови (около 99 %).

Взаимодействие с другими препаратами

Диклофенак может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек Срок годности: не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Условия хранения

Не допускать замерзания