Инструкция по применению
ДИМ Капсулы 200 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ДИМ 200 мг от Evalar Laboratory содержит активную биодоступную форму индола – дииндолилметан. Состав препарата усилен витамином Е в высокой концентрации, а также экстрактом черного перца.Дииндолилметан 200 мг от Evalar Laboratory: способствует поддержанию нормального уровня эстрогенов в женском организме, стимулирует расщепление жиров и способствует похудению, уменьшает симптоматику предменструального синдрома и менопаузы, применяется при комплексном подходе в лечении акне. Дииндолилметан (ДИМ) — это вещество, которое образуется при переваривании овощей семейства крестоцветных (брокколи или брюссельская капуста) желудочным соком. В процессе переваривания соединение, называемое индол-3-карбинол, расщепляется и в результате образуется — дииндолилметан.ДИМ 200 мг от Evalar Laboratory способствует поддержанию в организме нормального уровня эстрогена, а также замедляет фермент ароматазу, который преобразует тестостерон в эстроген.Дииндолилметан также используют для предотвращения увеличения простаты, лечения акне, снижения веса и уменьшения предменструального синдрома (ПМС) и симптомов менопаузы.Кроме того, добавки, содержащие дииндолилметан, могут стимулировать расщепление жиров и замедлять формирование жировых клеток, способствуя похудению.

Состав

Содержание в 2-х капсулах: Витамин Е 80 мг Дииндолилметан 400 мг Концентрат капусты брокколи 200 мг Перца черного экстракт (пиперин) 5 мг

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина Е, содержащей дииндолилметан.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать 1–2 капсулы в день, запивая водой.Продолжительность приема: не менее 1 месяца.При необходимости прием можно продолжить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.