Инструкция по применению
Димефосфон Раствор для приема внутрь и наружного применения 15 % 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Диметилоксобутилфосфонил-диметилат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 15%
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Диметилоксобутилфосфонил-диметилат

Форма выпуска

Раствор

Показания

Внутрь в составе комплексной терапии: Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения, последствия ишемического и геморрагического инсультов, черепно-мозговые и нейрохирургические травмы, плановые нейрохирургические операции, остеохондроз, рассеянный склероз, хронические неспецифические заболевания легких с признаками дыхательной и легочно-сердечной недостаточности (применение димефосфона не снимает приступов удушья и не влияет на частоту использования аэрозолей бета-адреномиметиков), вегето-сосудистая дистония по парасимпатическому типу, хроническая цереброваскуляторная недостаточность вследствие атеросклероза и гипертонической болезни, мигрень, болезнь Меньера, заболевания органов дыхания, ацидозы, атопическая бронхиальная астма и поллиноз. Наружно: Инфекционно-воспалительно-аллергические заболевания кожи и слизистых оболочек: раны, области швов и места выхода спиц Илизарова; рожистые воспаления; в дерматологии - комплексное лечение заболеваний кожи (угри, жирная себорея, розовые угри); профилактика лучевого мукозита.

Способ применения и дозы

Внутрь димефосфон применяют после еды, запивая водой. Курс лечения зависит от характера заболевания и продолжается от 3 дней до 2 месяцев. В комплексной терапии следующих заболеваний и состояний: При остром и хроническом нарушении мозгового кровообращения, последствиях ишемического и геморрагического инсультов, черепно-мозговой и нейрохирургической травме взрослым по 15 мл (1 столовой ложке) 3-4 раза в день. Длительность курса 2-3 недели, в отдельных случаях до 6 недель. При плановых нейрохирургических операциях по 15 мл (1 столовой ложке) в течение 5 дней до и 2 месяцев после операции. При остеохондрозе взрослым по 10 мл (1 десертной ложке) 3-4 раза в день в течение 2-3 недель, улучшение наблюдается на 8-10 день лечения. При рассеянном склерозе взрослым по 100 мг/кг (45 мл) в сутки - по 15 мл (1 столовой ложке) 3 раза в день в течение 10 дней в осенне-весенний период ежемесячно. При хронических неспецифических заболеваниях легких с признаками дыхательной и легочно-сердечной недостаточности взрослым по 15 мл (1 столовой ложке) 3-4 раза в день. Курс - 7-10 дней. Применение димефосфона не снимает приступов удушья и не влияет на частоту использования аэрозолей бета-адреномиметиков. При вегето-сосудистой дистонии по парасимпатическому типу взрослым по 15 мл (1 столовой ложке) 3 раза в день в течение 2-3 недель, детям старше 12 лет по 50 мг/кг (10-15 мл) 3 раза в день в течение 3 недель. При хронической цереброваскуляторной недостаточности вследствие атеросклероза и гипертонической болезни по 15 мл (1 столовой ложке) 3 раза в день в течение 2-3 недель. При мигрени по 15 мл (1 столовой ложке) 3 раза в день в течение 2-3 недель. При болезни Меньера по 15 мл (1 столовой ложке) 3 раза в день в течение 3 недель. При заболеваниях органов дыхания, ацидозах, атопической бронхиальной астме и поллинозе взрослым назначают по 15-25 мл, детям до 3 лет — 5 мл (1 чайная ложка), 3-8 лет — 10 мл (1 десертной ложке), старше 8 лет - 15 мл (столовая ложка) 3 раза в день, при тяжелом течении — по 4 раза в день в течение 4-5 недель. При атопической бронхиальной астме в сочетании с поллинозом назначают за 2-3 недели до начала ухудшений и принимают в течение всего периода цветения. Наружно При инфекционно-воспалительно-аллергических заболеваниях кожи и слизистых оболочек в виде повязок, турунд и примочек с раствором ежедневно в течение 3 – 14 дней. При комплексном лечении угревой болезни протирают кожу 3 – 4 раза в день, вечером - примочки. При роже – смазывают зону воспаления 3 раза в день в течение 3 – 5 дней. На область швов и мест выхода спиц Илизарова накладывают ежедневно марлевые салфетки, пропитанные димефосфоном в течение 7-14 дней. Для профилактики лучевого мукозита — марлевые салфетки, смоченные димефосфоном, укладываются в проекции пучков излучения за 20 минут до экспонирования дозы.

Противопоказания

Эпилепсия, хроническая почечная недостаточность 3 степени (клиренс креатинина менее 40 мл/мин).

Побочные действия

Диспептические явления, сонливость и ухудшение концентрации внимания (к 3-4-му дню приема препарата проходят).

Условия хранения

В сухом месте