Инструкция по применению
Диосмин-Вертекс Таблетки 600 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диосмин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 600 мг

Описание

Овальные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета. На поперечном разрезе ядро серовато-желтого или светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Диосмин

Состав

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: действующее вещество: диосмин - 600,00 мг, вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 241,50 мг, тальк - 18,00 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 13,50 мг, кроскармеллоза натрия - 13,50 мг, магния стеарат - 9,00 мг, кремния диоксид коллоидный гидрофобный - 4,50 мг, пленочная оболочка: [гипромеллоза - 16,20 мг, тальк - 5,40 мг, титана диоксид - 2,79 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 2,43 мг, краситель железа оксид красный (железа оксид) - 0,18 мг] или [сухая смесь для пленочного покрытия, содержащая гипромеллозу (60%), тальк (20%), титана диоксид (10,33%), макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) (9%), краситель железа оксид красный (железа оксид) (0,67%)] - 27,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание После приема внутрь препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и определяется в плазме крови через 2 часа. Распределение Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 5 часов после приема. Равномерно распределяется и накапливается во всех слоях стенки полых вен и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени - в почках, печени, легких и других органах. Избирательное накопление диосмина и/или его метаболитов в венозных сосудах достигает максимума к девятому часу после приема и сохраняется в течение 96 часов. Выведение Выводится преимущественно почками - 79%, также кишечником - 11%, с желчью - 2,4%.

Показания

Лечение симптомов лимфовенозной недостаточности нижних конечностей (ощущение тяжести, усталости, распирания в ногах, боль, усиливающаяся к концу дня, отеки), лечение симптомов острого геморроя, дополнительное лечение при нарушении микроциркуляции,

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь. Лимфовенозная недостаточность вен нижних конечностей При хронической лимфовенозной недостаточности назначают по 1 таблетке в сутки утром желательно до еды. Обычно курс приема составляет 2 месяца. Острый геморрой и обострение хронического геморроя При остром геморрое и обострении хронического геморроя препарат назначают первые четыре дня по 1 таблетке 3 раза в сутки во время еды, в последующие три дня по 1 таблетке 2 раза в сутки во время еды. В случае повторного возникновения симптомов курс лечения может быть повторен по рекомендации врача. Хронический геморрой После купирования острых явлений рекомендуется продолжить прием препарата по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение 1-2 месяцев. Если пропущен один или несколько приемов препарата, необходимо продолжать применение препарата в обычном режиме и в обычной дозе. Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период грудного вскармливания (опыт применения ограничен), детский возраст до 18 лет (опыт применения ограничен).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Применение в период беременности возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного воздействия на плод. До настоящего времени в клинической практике не было сообщений о случаях мальформационного или фетотоксического действия на плод при применении препарата у беременных. Период грудного вскармливания Из-за отсутствия данных о проникновении препарата в грудное молоко, кормящим женщинам не рекомендуется прием препарата.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто ⩾ 1/10, часто от ⩾ 1/100 до нечасто от ⩾ 1/1000 до редко от ⩾ 1/10000 до очень редко частота неизвестна - по имеющимся данным установить частоту возникновения не представляется возможным. Желудочно-кишечные нарушения: редко - диспептические расстройства (изжога, тошнота, боль в животе). Нарушения со стороны нервной системы: редко - головная боль. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы Симптомы передозировки не описаны. Лечение Специфический антидот неизвестен. При передозировке препарата немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых эффектов взаимодействия диосмина с другими лекарственными средствами не описано. Следует информировать Вашего лечащего врача обо всех принимаемых Вами лекарственных препаратах.

Особые указания

Лечение острого геморроя проводят в комплексе с другими методами лечения. В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса лечения, следует проконсультироваться со специалистом, который подберет дальнейшую терапию. При нарушении венозного кровообращения (варикозное расширение вен нижних конечностей, хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей) максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии с изменениями образа жизни: желательно избегать длительного пребывания в вертикальном положении, уменьшить избыточную массу тела. В некоторых случаях улучшению циркуляции крови способствует ношение специальных чулок (компрессионного трикотажа). В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания обратитесь к врачу. Не превышайте максимальные сроки и рекомендованные дозы препарата без консультации врача.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.