Инструкция по применению
Дип Рилиф Гель 100 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Великобритания
Производитель: ДЕЛЬТА МЕДИКАЛ ПРОМОУШНЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ибупрофен+Левоментол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 50 мг+ 30 мг/1 г
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Ибупрофен+Левоментол

Состав

Действующее вещество: Ибупрофен 5,00 г, Левоментол (ментол) 3,00 гВспомогательные вещества: Вода очищенная 44,50 г, Этанол денатурированный 96 % 30,00 г, Пропиленгликоль 10,00 г, Диизопропаноламин 5,50 г, Карбомер 2,00 гКонцентрация действующего вещества (г): 8 г

Форма выпуска

Гель

Способ применения и дозы

Наружно. Для взрослых и детей старше 14 лет. Небольшое количество геля (3-5 см) до 4 раз в сутки наносят тонким слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают. Всегда мойте руки после применения ДИП Рилифа, если они не являются объектом для лечения. Продолжительность использования препарата без консультации врача не более 10 дней. При необходимости более длительного применения проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ибупрофену или к другим компонентам препарата, бронхиальная астма, провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, беременность, период лактации, детский возраст (до 14 лет), нарушение целостности кожных покровов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Пациентам с заболеваниями почек перед применением препарата требуется консультация врача.Гель следует наносить на неповрежденную кожу, избегая попадания попадания в глаза, на слизистые оболочки и открытые раневые поверхности. После нанесения не следует накладывать окклюзионную (воздухонепроницаемую) повязку.При длительном применении препарата в больших дозах появляется риск развития побочных эффектов.Использование в педиатрииДип Рилиф не следует применять у детей до 14 лет без соответствующей рекомендации врача.

Побочные действия

Дип Рилиф может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

Передозировка

Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение). Системные реакции: генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции, крапивница, ангионевротический отек, бронхоспастические реакции), фотосенсибилизация.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Случаи передозировки не описаны.

Условия хранения

В сухом месте