Инструкция по применению
Дипана Таблетки покрытые пленочной оболочкой 48 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Сентисс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракт сухой пикроризы курроа+андрографиса метельчатого+эклипты белой+филлантуса нирури
Количество в упаковке: 48

Описание

Продолговатые, двояковыпуклые, с закругленными концами таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-зеленого цвета, со специфическим запахом, на изломе серого цвета, с черными, коричневато-черными пятнами.

Действующее вещество

Экстракт сухой пикроризы курроа+андрографиса метельчатого+эклипты белой+филлантуса нирури

Состав

Активное вещество: 1 таблетка содержит: Пикроризы курроа (Picrorhiza Kurroa Benth.) 80 мг, Андрографиса метельчатого (Andrographispaniculata Nees.) 40 мг, Эклипты белой (Ecliptaalba Hassk.) 40 мг, Филлантуса нирури (Phyllanthus niruri L.) 40 мг, Паслена черного (Solanum nigrum L.) 30 мг, Тиноспоры сердцелистной (Tinospora cordifolia Miers.) 30 мг, Иссопа водного (Васора monnieri Linn.) 10 мг, Берхавии раскидистой (Boerhaavia diffusa L.) 10 мг, Имбиря лекарственного (Zingiber officinale Roscoe) 10 мг, Перца длинного (Piper longum L.) 8 мг. Вспомогательные вещества: Крахмал кукурузный высушенный 60,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 170,0 мг, тальк 7,5 мг, магния стеарат 5,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 5,0 мг, кроскармеллоза натрия 5,0 мг, натрия лаурилсульфат 2,5 мг, метилпарагидроксибензоат натрия 1,5 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 0,5 мг, натрия бензоат 2,0 мг, бронопол 0,12 мг. оболочка: пленочное покрытие «Опадрай II белый» («Opadry II white 85G568918») – 9,50 мг (лецитин (соя), диоксид титана, полиэтилен гликоль/макрогол, тальк, поливиниловый спирт). пленочное покрытие «Опадрай II зелёный» («Opadry II Green 85G51606») – 21,50 мг (полиэтиленгликоль, FD&C синий №1 алюминиевый лак, лецитин, поливиниловый спирт, диоксид титана, тальк, хинолиновый жёлтый алюминиевый лак). Вода очищенная (испаряется в процессе производства).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные гепатиты в комплексной терапии, алкогольная болезнь печени, жировая дистрофия печени различной этиологии, цирроз печени в комплексной терапии, профилактически при хронических интоксикациях (в т. ч. при длительном употреблении алкоголя), гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Внутрь. Таблетки Дипана® следует принимать до приема пищи или жидкости, запивая достаточным количеством воды. При лечении алкогольной болезни печени, жировой дегенерации по 2-3 таблетки 2 раза в день 8-12 недель. При лечении гепатитов, при токсических и лекарственных поражениях, циррозе печени по 2 таблетки 3 раза в день 4-8 недель. При гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей по 1-2 таблетки 3 раза в день 4-8 недель. Для профилактики поражений печени при хронических интоксикациях по 1-2 таблетки 3 раза в день 4-8 недель.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания. Учитывая отсутствие опыта применения препарата у детей младше 10 лет, не рекомендуется использование данного препарата у этой возрастной группы.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях наблюдаются следующие преходящие явления: сухость во рту, тошнота, спазмы кишечника, диарея, нарушение сна, головные боли, усиление диуреза.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С, в сухом, защищенном от света и не доступном для детей месте.