Инструкция по применению
Дисоль Раствор для инфузий 200 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Натрия ацетат+Натрия хлорид
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Действующее вещество

Натрия ацетат+Натрия хлорид

Состав

Дейстующие вещества: Натрия хлорид - 6 г Натрия ацетат - 2 г (натрий уксуснокислый 3-водный) Вспомогательное вещество: Вода для инъекций - до 1л

Форма выпуска

Раствор

Показания

Регидратация, гиперкалиемия, интоксикации на фоне обезвоживания (холера, острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция).

Способ применения и дозы

Внутривенно (струйно и капельно), под контролем лабораторных показателей. Соотношение введенной жидкости и диуреза определяют каждые 6 ч. В течение 1 ч вводят раствор в количестве, соответствующем 7-10 % массы тела больного, затем струйное введение заменяют капельным, в течение 24-48 ч, со скоростью 40-120 кап /мин. Перед введением раствор подогревают до 36-38о С. Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой, потом. При тяжелых формах заболеваний (гиповолемический инфекционно-токсический шок, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения репарата с последующим переходом к капельному. При более легких формах заболеваний (интоксикация и обезвожение организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиться капельным введением препарата. После устранения гиперкалиемии дальнейшая водно-солевая терапия проводится растворами "Трисоль", "Ацесоль" или "Хлосоль".

Противопоказания

Гиперчувствительность, почечная и хроническая сердечная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности и лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (адекватных и строго контролируемых исследований не проведено).

Побочные действия

Отеки, тахикардия. В некоторых случаях возможно возникновение озноба.

Передозировка

Симптомы: гипокалиемии, гипернатриемии. Лечение: коррекция электролитных расстройств, контроль уровня электролитов в крови.

Взаимодействие с другими препаратами

Не установлены

Особые указания

Терапию проводят под контролем гематокрита и концентрации электролитов крови. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Данные отсутствуют из-за применения препарата исключительно в стационаре.

Условия хранения

При температуре ниже 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Замораживание препарата не является противопоказанием к его применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки (полимерного контейнера) не является противопоказанием к применению препарата.