Инструкция по применению
Дисоль раствор для инфузий флакон 400 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МЕДПРО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Натрия ацетат+Натрия хлорид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 6 г+2 г/л



Описание

Комбинированный солевой раствор для регидратации и дезинтоксикации. Восстанавливает водно-электролитный баланс и КОС в организме при обезвоживании. Препятствует развитию метаболического ацидоза, увеличивает диурез. Оказывает плазмозамещающее, дезинтоксикационное, регидратирующее действие.

Действующее вещество

Натрия ацетат+Натрия хлорид

Состав

Натрий уксуснокислый, натрия хлорид, вода для инъекций.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Регидратация, гиперкалиемия, интоксикации на фоне обезвоживания (холера, острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция).

Способ применения и дозы

Внутривенно (струйно и капельно), под контролем лабораторных показателей. Соотношение введенной жидкости и диуреза определяют каждые 6 ч. В течение 1 ч вводят раствор в количестве, соответствующем 7-10% массы тела больного, затем струйное введение заменяют капельным, в течение 24-48 ч, со скоростью 40-120 кап /мин. Перед введением раствор подогревают до 36-38 град.С. Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой и потом.При тяжелых формах заболеваний (гиповолемический инфекционно-токсический шок, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному.При более легких формах заболеваний (интоксикация и обезвожение организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиваться капельным введением препарата.После устранения гиперкалиемии дальнейшая водно-солевая терапия проводится растворами "Трисоль", "Ацесоль" или "Хлосоль".

Применение при беременности и кормлении грудью

Требуется консультация наблюдающего врача.

Побочные действия

Отеки, тахикардия. В некоторых случаях возможно возникновение озноба.

Особые указания

Противопоказания к применению: гиперчувствительность, почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность.