Инструкция по применению
Дивина таблетки 21 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Финляндия
Производитель: OrionFarma
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Медроксипрогестерон+Эстрадиола валерат и Эстрадиола валерат [набор]
Количество в упаковке: 21
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Медроксипрогестерон+Эстрадиола валерат и Эстрадиола валерат [набор]

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: эстрадиола валерат 2 мг.; Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, желатин, магния стеарат, тальк, вода очищенная.; 1 таблетка содержит: Активное вещество: эстрадиола валерат 2 мг, медроксипрогестерона ацетат 10 мг.; Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, желатин, магния стеарат, тальк, коллидон 25, индигокармин (E132), вода очищенная.;

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Эстрадиола валерат;Всасывание;При приеме препарата внутрь эстрадиола валерат хорошо абсорбируется из ЖКТ.; Метаболизм и выведение;Эстрадиола валерат биотрансформируется преимущественно в печени с образованием менее активного эстриола. Метаболиты эстрадиола выводятся из организма с мочой в виде растворимых в воде соединений с глюкуроновой и серной кислотами.; Медроксипрогестерона ацетат;Всасывание и распределение;При приеме 1 таблетки Дивина внутрь медроксипрогестерона ацетат хорошо абсорбируется из ЖКТ, Cmax в плазме крови составляет от 1 до 5 нг/мл и достигается через 2-4 ч. Медроксипрогестерон практически не связывается с белками плазмы.; Выведение; Медроксипрогестерон выводится в виде метаболитов с мочой и желчью.

Показания

- Купирование симптомов, являющихся следствием дефицита эстрогена и прогестерона у женщин в климактерическом периоде; - Профилактика остеопороза у женщин в постменопаузе.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таб./сут (предпочтительнее вечером) в течение 21 дня, затем следует 7-дневный перерыв, во время которого наступает менструальноподобное кровотечение, после чего вновь начинают прием таблеток (см. маркировку на упаковке с календарной шкалой).; В течение первых 11 дней принимают таблетки, содержащие только эстроген (белые).; Затем в течение оставшихся 10 дней - таблетки, содержащие комбинацию эстрогена с прогестероном (голубые).; Прием таблеток можно начинать в любое время, если нормальный менструальный цикл прекратился или если он нерегулярен, а также на 5-й день менструации.; В случае пропуска приема таблетки ее следует принять не позднее 12 ч и далее принимать препарат по обычной схеме.

Противопоказания

- тромбоэмболические нарушения или патология сосудов головного мозга в анамнезе (в т.ч. в семейном); - серповидно-клеточная анемия; - опухоли гипофиза; - эстрогенозависимые опухоли (рак молочной железы, матки); - острые и хронические заболевания печени; - эндометриоз; - артериальная гипертензия, резистентная к терапии; - беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Дивина противопоказана к применению при беременности.; Препарат не может быть использован в качестве контрацептивного средства.

Побочные действия

Со стороны половой системы: редко - нарушение регулярности кровотечений (метроррагии), нагрубание молочных желез.; Со стороны ЦНС: редко - головная боль, повышенная утомляемость.; Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота.; Прочие: редко - ощущение тяжести в нижних конечностях.

Передозировка

Симптомы: тошнота, головная боль, прорывные маточные кровотечения.; Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении Дивина может снижать эффективность антигипертензивных средств, пероральных антикоагулянтов и пероральных гипогликемических препаратов.; Барбитураты, противосудорожные препараты, тетрациклины и рифампицин уменьшают эффект Дивины при их одновременном применении.

Особые указания

В климактерический период возможны различия в продолжительности менструального цикла, поэтому у некоторых женщин кровотечение может начаться еще во время приема голубых таблеток препарата Дивина. В этих случаях необходимо временно прекратить прием препарата, а после окончания кровотечения возобновить прием белых таблеток.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Дивина не влияет на способность к вождению автомобиля и занятиям другими видами деятельности, требующей повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей