Инструкция по применению
Дюспаталин Таблетки 135 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мебеверин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 135 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Мебеверин

Состав

Мебеверина гидрохлорид 135 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 97 мг, крахмал картофельный - 45 мг, повидон К25 - 5.5 мг, тальк - 12 мг, магния стеарат - 5.5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь подвергается пресистемному гидролизу и не обнаруживается в плазме. Метаболизируется в печени до вератровой кислоты и мебеверинового спирта. Выводится главным образом почками в виде метаболитов, в небольших количествах – желчью (полностью - в течение 24 ч) .

Показания

Спастические состояния ЖКТ, обусловленные органическими заболеваниями. Симптоматическое лечение болей, спастических состояний, неприятных ощущений при синдроме раздраженного кишечника.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 100 мг 4 раза или по 135 мг 3 раза/сут. При достижении желаемого клинического эффекта дозу постепенно снижают в течение нескольких недель.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять Дюспаталин® во время беременности. Не следует принимать Дюспаталин® во время кормления грудью.

Побочные действия

Со стороны кожных покровов: крапивница (аллергическая сыпь), ангионевротический отек (серьезная аллергическая реакция, которая может включать: затруднение дыхания, отечность лица, шеи, губ, языка, горла), отек лица, экзантема (кожная сыпь). Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (анафилактические реакции – серьезные аллергические реакции, которые могут включать: затруднение дыхания, учащенный пульс, резкое снижение артериального давления (слабость и головокружение), потоотделение).

Передозировка

В случае передозировки препаратом Дюспаталин® необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Рекомендуется симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследования на животных продемонстрировали отсутствие какого-либо взаимодействия между препаратом Дюспаталин® и этиловым спиртом.

Особые указания

Перед приемом препарата Дюспаталин® необходимо проконсультироваться с врачом, в случае: Обратитесь к врачу, если на фоне приема препарата состояние ухудшилось или не наступило улучшение симптомов после 2 недель применения.

Условия хранения

В сухом месте