**Инструкция по применению**
**Доброкам Таблетки 250 мг 30 шт**

### Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бромкамфора
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 60.0

### Действующее вещество

Бромкамфора

### Состав

Бромкамфора 250 мг;Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 41 мг, тальк - 9 мг.

### Форма выпуска

Таблетки

### Фармакокинетика

Легко абсорбируется в ЖКТ. Проникает через гистогематические барьеры, включая плацентарный. Гидроксилируется в печени до оксиметаболитов, которые в виде глюкуронидов выводятся почками.

### Показания

— повышенная возбудимость; — астения; — кардиалгия; — тахикардия; — лабильность артериального давления.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды.;Взрослым и детям старше 14 лет - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут; детям в возрасте 7-10 лет - по 1 таб. 2 раза/сут; детям в возрасте 10-14 лет - по 1 таб. 2-3 раза /сут.;Максимальная суточная доза: для взрослых и детей старше 14 лет - 1.5 г; для детей в возрасте 7-10 лет - 0.5 г; для детей в возрасте 10-14 лет - 0.75 г. Курс лечения - 10-15 дней.

**Противопоказания**

— гиперчувствительность к камфоре, бромидам или другим компонентам препарата; — печеночная и/или почечная недостаточность; — детский возраст до 7 лет.;С осторожностью: пациентам с нарушениями функции печени, с аллергическими заболеваниями в анамнезе.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

При беременности и в период грудного вскармливания применяется по согласованию с врачом. Необходимо соотнести пользу от применения у матери и риск для плода или ребенка.

**Побочные действия**

Аллергические реакции, заторможенность, сонливость, диспептические явления.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, угнетение ЦНС, затрудненное дыхание, характерный запах камфоры в выдыхаемом воздухе, дыхательная недостаточность, кома.;Лечение: промывание желудка, назначение внутрь солевых слабительных и активированного угля внутрь. При судорогах применяют в/в диазепам или быстродействующие барбитураты (тиопентал натрия). Гемодиализ с липидным диализатом.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы принимаете другие препараты.

**Особые указания**

Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций;В период лечения необходимо отказаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В сухом месте