Инструкция по применению
Доксазозин таблетки 2 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Доксазозин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 24



Описание

Состав Доксазозин (в форме мезилата) 2 мг Фармакологическое действие Селективный конкурентный блокатор постсинаптических .1-адренорецепторов. Вызывает расширение периферических сосудов, что приводит к уменьшению ОПСС и снижению АД. Способствует повышению коэффициента ЛПВП/общий холестерин, снижению суммарного уровня триглицеридов и холестерина. При длительном применении наблюдается регрессия гипертрофии левого желудочка, происходит подавление агрегации тромбоцитов и повышение содержания в тканях активатора плазминогена. Блокада .1-адренорецепторов, расположенных в строме и капсуле предстательной железы, в шейке мочевого пузыря приводит к снижению сопротивления и давления в мочеиспускательном канале, уменьшению сопротивления в его внутреннем отверстии. Улучшает уродинамику и уменьшает проявления доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Способ применения и дозы Начальная доза составляет 1 мг/сут. Через 1-2 недели, в зависимости от клинической ситуации, доза может быть увеличена до 2 мг/сут, а затем через 1-2 недели - до 4 мг, 8 мг или 16 мг/сут для достижения оптимального терапевтического эффекта. В среднем суточная доза составляет 2-4 мг. Максимальная доза: 16 мг/сут. Меры предосторожности В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать

средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента. Побочное действие Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические реакции (в т.ч. обмороки), тахикардия, аритмия, периферические отеки. Со стороны пищеварительной системы: тошнота. Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, чувство усталости, раздражительность, астения, сонливость. Прочие: ринит. Особые указания С осторожностью следует применять при отеке легких, вызванном стенозом митрального клапана или аортальным стенозом . сердечной недостаточности с повышенным сердечным выбросом . правожелудочковой недостаточности, обусловленной эмболией легочной артерии или экссудативным перикардитом . левожелудочковой недостаточности с низким давлением заполнения . нарушениях мозгового кровообращения . у пациентов пожилого возраста . одновременном применении с ингибиторами ФДЭ-5 (угроза возникновения симптоматической артериальной гипотензии) . при печеночной недостаточности . при беременности . при проведении операции по поводу удаления катаракты. После приема доксазозина в начальной дозе возможно развитие ортостатической гипотензии (феномен первой дозы), особенно в положении стоя. Чаще такое состояние наблюдается у пациентов с гиповолемией, дефицитом натрия, у лиц пожилого возраста. В связи с этим начальную дозу рекомендуется принимать перед сном. Клинический опыт применения доксазозина у детей отсутствует. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период приема доксазозина, особенно в начале лечения, следует соблюдать осторожность при выполнении работы, требующей повышенной скорости психомоторных реакций, в связи с возможным развитием сонливости, головокружения. Применение при беременности и кормлении грудью Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения доксазозина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось. Применение возможно только в случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Тип: Лекарственное средство Количество в упаковке, шт: 20 Срок годности: 24 мес Действующее вещество: Доксазозин (Doxazosin) Путь введения: Перорально Порядок отпуска: По рецепту Форма выпуска: По рецепту Условия хранения: В сухом месте, В защищенном от солнца помещении, Беречь от детей Максимальная допустимая температура хранения, °C: 25 Фармакологическая группа: C02CA04 Доксазозин Минимальный возраст от: 18 лет

Действующее вещество

Доксазозин

Состав

Доксазозин (в форме мезилата) 2 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Артериальная гипертензия. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (симптоматическое лечение).

Способ применения и дозы

Начальная доза составляет 1 мг/сут. Через 1-2 недели, в зависимости от клинической ситуации, доза может быть увеличена до 2 мг/сут, а затем через 1-2 недели - до 4 мг, 8 мг или 16 мг/сут для достижения оптимального терапевтического эффекта. В среднем суточная доза составляет 2-4 мг. Максимальная доза: 16 мг/сут.

Противопоказания

Тяжелая печеночная недостаточность . инфекции мочевыводящих путей . анурия . прогрессирующая почечная недостаточность . артериальная гипотензия с ортостатическими нарушениями (в т.ч. в анамнезе) . артериальная гипотензия (относится только к показанию доброкачественная гиперплазия предстательной железы) . сопутствующая обструкция верхних мочевыводящих путей . хронические инфекции мочевыводящих путей . камни в мочевом пузыре . обструктивные расстройства органов ЖКТ . обструкция пищевода . уменьшение диаметра просвета органов ЖКТ любой степени . непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи с наличием в составе лактозы) . детский и подростковый возраст до 18 лет . период лактации (грудного вскармливания) . повышенная чувствительность к производным хиназолина (например, к празозину, теразозину, доксазозину). В качестве монотерапии: пациентам с переполнением мочевого пузыря . анурия с или без прогрессирующей почечной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения доксазозина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось. Применение возможно только в случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические реакции (в т.ч. обмороки), тахикардия, аритмия, периферические отеки. Со стороны пищеварительной системы: тошнота. Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, чувство усталости, раздражительность, астения, сонливость. Прочие: ринит.

Особые указания

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические реакции (в т.ч. обмороки), тахикардия, аритмия, периферические отеки. Со стороны пищеварительной системы: тошнота. Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, чувство усталости, раздражительность, астения, сонливость. Прочие: ринит.

Условия хранения

В сухом месте