
Инструкция по применению
Доксазозин таблетки 2мг N60

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Доксазозин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 2 мг



Действующее вещество

Доксазозин

Состав

В 1 таб.: доксазозина мезилат 2.43 мг, что соответствует содержанию доксазозина 2 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 71.07 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 20 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 3 мг, повидон К25 - 2.4 мг, магния стеарат - 1 мг, натрия лаурилсульфат - 0.1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Артериальная гипертензия. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (симптоматическое лечение).

Противопоказания

Тяжелая печеночная недостаточность . инфекции мочевыводящих путей . анурия . прогрессирующая почечная недостаточность . артериальная гипотензия с ортостатическими нарушениями (в т.ч. в анамнезе) . артериальная гипотензия (относится только к показанию доброкачественная гиперплазия предстательной железы) . сопутствующая обструкция верхних мочевыводящих путей . хронические инфекции мочевыводящих путей . камни в мочевом пузыре . обструктивные расстройства органов ЖКТ . обструкция пищевода . уменьшение диаметра просвета органов ЖКТ любой степени . непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи с наличием в составе лактозы) . детский и подростковый возраст до 18 лет . период лактации (грудного вскармливания) . повышенная чувствительность к производным хиназолина (например, к празозину, теразозину, доксазозину). В качестве монотерапии: пациентам с переполнением мочевого пузыря . анурия с или без прогрессирующей почечной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения доксазозина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось. Применение возможно только в случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические реакции (в т.ч. обмороки), тахикардия, аритмия, периферические отеки. Со стороны пищеварительной системы: тошнота. Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, чувство усталости, раздражительность, астения, сонливость. Прочие: ринит.

Особые указания

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические реакции (в т.ч. обмороки), тахикардия, аритмия, периферические отеки. Со стороны пищеварительной системы: тошнота. Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, чувство усталости, раздражительность, астения, сонливость. Прочие: ринит.