Инструкция по применению
МИРРОЛЛА ДОКТОР ИЗЖОГИН СУСП. 150МЛ

Характеристики

Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Мирролла
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Антацидный препарат в форме гелеобразной суспензии. После приема внутрь средство взаимодействует с кислым содержимым желудка, образуя гель, имеющий почти нейтральное значение pH. Гель формирует защитную оболочку на поверхности содержимого желудка и предотвращая возникновение гастроэзофагеального рефлюкса. Входящие в состав компоненты: Альгинат натрия- высокомолекулярный полосахорид, относится к классу растворимых пищевых волокн(наряду с пектином и агар-агаром). Альгинат натрия вырабатывают из бурых и красных водорослей. Соли альгиновой кислоты являются хорошими электросорбентами, которыеи связывают и выводят из организма тяжелые металлы. Реагирует с соляной кислотой, содержащейся в желудке, и образует барьер, который не всасывается в ЖКТи механически припятствует выбросу кислоты в пищеводах; способствует восстановлению клеток слизистой желудка и пищеводах; является дополнительным источником пищевых волокн. Карбонат кальция- соль угольной кислоты. Имеет способность нейтролизовать соляную кислоту, ослабляя ее повреждающее действие, и тем самым уменьшить неприятные ощущения в желудке. Кальций- важнейший макроэлемент, входящий в состав костной ткани. Ионы кальция участвуют в стабилизации клеточных мембран и межклеточной взаимодействии. Натрия гидрокарбонат- натриевая соль угольной кислоты. Обладает быстрым противокислотным эффектом, способствует защите органов пищеварения то действия соляной кислоты.

Состав

Вода очищенная, гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности), карбонат кальция, альгинат натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза (стабилизатор), бензойная кислота (консервант), сахаринат натрия (подсластитель), эфирное масло мяты

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Источник растворимых пищевых волокон (альгинатов), дополнительный источник кальция.

Способ применения и дозы

Перед употреблением продукт рекомендуется размешать/взболтать. Взрослым по 15 мл (1 столовая ложка) 3 раза в день после еды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.