Инструкция по применению
Доктор Мом® Сироп от кашля флакон 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

Сухие экстракты, выделенные из:адатоды васики листьев, корней, цветков, коры (Adhatoda vasika) 600 мг, алоэ барбадосского листьев, сока и мякоти (Aloe barbadensis) 500 мг, базилика священного листьев, семян и корней (Ocinum sanctum) 1000 мг, девясила кистецветного корней (Inula racemosa) 200 мг, имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale) 100 мг, куркумы длинной корневищ (Curcuma longa) 500 мг, паслена индийского корней, плодов, семян (Solanum indicum) 200 мг, перца кубебы плодов (Piper cubeba) 100 мг, солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra) 600 мг, терминалии белерики плодов (Terminalia belerica) 200 мг, левоментол 60 мг. Вспомогательные вещества: сахароза - 75 г, глицерол - 5 г, лимонной кислоты моногидрат - 65 мг, натрия бензоат - 350 мг, метилпарагидроксибензоат натрия - 100 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия - 50 мг, сорбиновая кислота - 50 мг, краситель BQ Супра (смесь красителей хинолинового желтого и бриллиантового голубого) - 60 мг, ароматизатор ананасовый - 0.2 мл, вода очищенная - до 100 мл.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой:— фарингит— ларингит, в т.ч. лекторский— трахеит— бронхит.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) 3 раза/сут; в возрасте от 6 до 14 лет - по 1/2-1 чайной ложке (2.5-5 мл) 3 раза/сут. Взрослым и детям старше 14 лет - по 5-10 мл 3 раза/сут. Курс лечения - 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

— дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция— детский возраст до 3 лет— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует назначать препарат пациентам с сахарным диабетом.

Условия хранения

В сухом месте