Инструкция по применению
Доктор Мом® Сироп от кашля флакон 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

На 100 мл сиропа: #### АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: сухие экстракты, выделенные из: * Адатоды васики листьев, корней, цветков, коры (Adhatoda vasika) - 600 мг * Алоэ барбадосского листьев, сока и мякоти (Aloe barbadensis) - 500 мг * Базилика священного листьев, семян и корней (Ocimum sanctum) - 1000 мг * Девясила кистецветного корней (Inula racemosa) - 200 мг * Имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale) - 100 мг * Куркумы длинной корневищ (Curcuma longa) - 500 мг * Паслена индийского корней, плодов, семян (Solanum indicum) - 200 мг * Перца кубебы плодов (Piper cubeba) - 100 мг * Солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra) - 600 мг * Терминалии белерики плодов (Terminalia belerica) - 200 мг * Левоментол - 60 мг #### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: сахароза, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, натрия бензоат, метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, сорбиновая кислота, краситель BQ Супра (смесь красителей хинолинового желтого и бриллиантового голубого), ароматизатор ананасовый, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой (фарингит, ларингит, в том числе «лекторский», трахеит, бронхит).

Способ применения и дозы

ВЗРОСЛЫМ и ДЕТЯМ старше 14 лет: Курс лечения – 2 – 3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции

Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе для взрослых (5,0 - 10,0 мл) содержится 3,75 – 7,50 г сахарозы, что соответствует 0,31 – 0,62 ХЕ. Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Условия хранения

При температуре не выше 30 ºС. Хранить в местах, недоступных для детей. 2 года. Не использовать после истечения срока годности.