
Инструкция по применению
Долгит Крем для наружного применения 5 % 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Германия
Производитель: ДР.Тайсс Натурварен
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ибупрофен
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородный, мягкий крем от белого до белого с кремовым опенком цвета с легким специфическим запахом

Действующее вещество

Ибупрофен

Состав

в 100 г крема содержится 5 г активного вещества ибупрофена: вспомогательные вещества: триглицериды среднецепочные, вода очищенная, глицерил моностеарат, пропиленгликоль. макрокода- 100-стеарат, макрогола-30-стеарат. камедь ксантановая (Келтрол Р), метилпарагидроксибензоат натрия, лаванды масло, апельсина цветков масло (нероловое масло)

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При нанесении крема на кожу ибупрофен проникает в более глубокие ткани (подкожную клетчатку, мышцы, суставы, синовиальную жидкость) и достигает в них терапевтических концентраций. Терапевтический эффект в зоне применения достигается прямым распределением через кожу в ткани-мишени. В незначительном количестве определяется в плазме крови. При рекомендуемом способе нанесения концентрация в синовиальной жидкости - около 2 мкг/мл.

Показания

- Воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательной системы: суставной синдром при обострении подагры, артрит (ревматоидный, псориатический, подагрический), плечелопаточный периартрит, анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева), деформирующий остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, тендинит, тендовагинит, бурсит, люмбаго, ишиас.- Мышечные боли (миалгии) ревматического и неревматического происхождения.- Травмы (спортивные, производственные, бытовые и др.) без нарушения целостности кожных покровов (вывихи, растяжения или разрывы мышц и связок, ушибы, посттравматические отёки мягких тканей и т.д).

Способ применения и дозы

НАРУЖНО! Крем наносят па кожу в области болезненного участка 3-4 раза в сутки и втирают легкими движениями до полного всасывания препарата. Используется полоска крема длиной 4-10 см в зависимости от площади пораженной поверхности. Длительность лечения зависит от степени тяжести заболевания и характера повреждения, и составляет, в среднем, 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ибупрофену, компонентам препарата и другим НПВП, мокнущие дерматозы, экзема, нарушения целостности кожных покровов (в том числе, инфицированные ссадины и раны) в месте нанесения крема, беременность, период лактации, детский возраст до 14 лет.

Побочные действия

Обычно препарат переносится хорошо. В редких случаях возможно временное появление признаков местного раздражения кожных покровов в виде покраснения, отека, высыпаний, зуда кожи, ощущения жжения и покалывания. В случае повышенной чувствительности к НПВП возможны явления бронхоспазма.

Особые указания

В тяжелых случаях рекомендуется комбинированное применение крема наружно с приемом других лекарственных форм НПВП (парентерально, внутрь, ректально). Следует избегать попадания крема в глаза и на другие слизистые оболочки. Применение препарата не оказывает влияния на деятельность, требующую повышенного внимания, координации движений, высокой скорости психических и физических реакций (например, у водителей транспорта, лиц, работающих со сложными механизмами, и т.п.).

Срок хранения после открытия

3 года.Не применять после окончания срока годности!