Инструкция по применению
Долгитблок 5%+3% Гель для наружного применения 20 г



Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Долоргит
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ибупрофен+Левоментол
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачный, бесцветный или желтоватого цвета гель с запахом ментола. Допускается наличие опалесценции и пузырьков воздуха.

Действующее вещество

Ибупрофен+Левоментол

Состав

Состав на 1 г геля: _Действующие вещества:_ ибупрофен - 50,0 мг, левоментол - 30,0 мг _Вспомогательные вещества:_ пропиленгликоль, этанол 96%, карбомер, диизопропаноламин, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

После нанесения на кожу ибупрофен обнаруживается в эпидермисе и дерме через 24 часа. Достигает высокой терапевтической концентрации в подлежащих мягких тканях, суставах и синовиальной жидкости. Клинически значимого системного всасывания практически не происходит. Максимальная концентрация ибупрофена в плазме крови при местном применении составляет 5% от уровня максимальной концентрации при пероральном применении ибупрофена. Ибупрофен подвергается метаболизму в печени. Выводится почками (в неизмененном виде не более 1%) и, в меньшей степени, с желчью через кишечник.

Показания

В качестве местного обезболивающего и противовоспалительного средства при таких состояниях как: * мышечная боль, * боль в спине, * артриты, * боль при повреждении связок и растяжениях, * спортивные травмы, * невралгия.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения. Взрослым и детям с 14 лет небольшое количество геля (полоску длиной 3-5 см) наносят тонким слоем на кожу над очагом поражения и втирают легкими движениями. Сразу после применения препарата необходимо вымыть руки, если они не являются объектом для лечения. Повторное применение препарата возможно не ранее, чем через 4 часа. Препарат можно наносить до 4 раз в течение 24 часов. Продолжительность использования препарата без консультации врача - не более 10 дней. При необходимости более длительного применения следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

* Повышенная чувствительность к ибупрофену или к другим компонентам препарата, * Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП, * Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (в том числе в анамнезе), * Нарушение целостности кожных покровов в месте нанесения препарата (в том числе инфицированные раны и ссадины, мокнущие дерматиты, экзема), * Детский возраст до 14 лет, * Беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

По данным Всемирной организации здравоохранения нежелательные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: _очень часто_ (≥ 10% назначений), _часто_ (≥ 1% и <10%), _не часто_ (≥ 0,1% и <1%), _редко_ (≥ 0,01% и < 0,1%), _очень редко_ (< 0,01%), _частота неизвестна_ (недостаточно данных для оценки частоты развития). _Нарушения со стороны иммунной системы:_ частота неизвестна: реакции гиперчувствительности (неспецифические аллергические реакции и анафилактические реакции), реакции со стороны дыхательных путей (бронхиальная астма, в т.ч. ее обострение, бронхоспазм, одышка, диспноэ), кожные реакции (зуд, крапивница, пурпура, эксфолиативные и буллезные дерматозы, в т.ч. токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, многоформная эритема, экзема, фотосенсибилизация), отек Квинке. _Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:_ частота неизвестна: абдоминальные боли, диспепсия. _Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:_ частота неизвестна: нарушение функции почек. _При длительном применении возможно развитие системных побочных эффектов НПВП._ _При появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу._

Передозировка

Явления передозировки при наружном применении препарата не описаны. В случае приема препарата внутрь возможно возникновение головной боли, рвоты, сонливости, снижения артериального давления. Рекомендовано промывание желудка (только в течение часа после приема), прием активированного угля, щелочное питье, форсированный диурез, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано. В связи с тем, что даже при местном применении ибупрофена нельзя полностью исключить возможность системного действия препарата, следует соблюдать осторожность при одновременном применении со следующими препаратами: антикоагулянты и тромболитические препараты, антигипертензивные средства, ацетилсалициловая кислота, другие НПВП. Теоретически, при одновременном применении с другими НПВП возможно усиление побочных эффектов.

Особые указания

Необходимо избегать попадания препарата в глаза, на губы и другие слизистые оболочки, поврежденные участки кожи. После нанесения на кожу не следует накладывать окклюзионную (герметичную) повязку. Следует избегать попадания солнечных лучей на область нанесения препарата. При длительном применении большого количества препарата появляется риск развития системных побочных эффектов. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.