Инструкция по применению
Долобене Гель для наружного применения 45 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 500 МЕ+25 мг+150 мг/1 г



Описание

Долобене - гель, предназначенный для лечения и профилактики различных заболеваний опорно-двигательной системы, таких как артрит, остеохондроз, радикулит, миозит и травмы. Он содержит комплекс активных ингредиентов, включая гепарин, декспантенол и диметилсульфоксид, которые обеспечивают противоотечное, противовоспалительное и болеутоляющее действие. Гель эффективно устраняет болевые ощущения и уменьшает отечность, способствуя быстрому восстановлению тканей. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

Действующее вещество

Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид

Состав

Препарат Долобене содержит: Действующими веществами препарата Долобене являются гепарин натрия, декспантенол, диметилсульфоксид 90 % раствор. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) препарата являются: карбомер (карбопол 980), трометамол, макрогола глицерилгидроксистеарат, изопропанол, розмарина масло, сосны горной масло, цитронеллы масло, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Показания

\- отеки, гематомы и воспаления мягких тканей, мышц, сухожилий, сухожильных влагалищ; \- закрытые травмы, ушибы; \- травмы суставов с растяжением связок и сухожилий; \- эпикондилит плеча («локоть теннисиста»), тендинит (воспаление сухожилий), тендовагинит (воспаление сухожильных влагалищ), бурсит (воспаление слизистой сумки сустава); \- периартрит плечевого сустава; \- острая невралгия. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Препарат Долобене следует наносить тонким поверхностным слоем на кожу над областью поражения мягких тканей, суставов или сухожилий 2-4 раза в день. Путь и (или) способ введения Наружно. При использовании препарата Долобене под повязку следует нанести гель и подождать несколько минут, чтобы он всосался кожей и испарился изопропанол. Затем можно наложить герметическую повязку. Препарат Долобене может применяться при ионофорезе. В этом случае препарат наносят под катод. Препарат Долобене как контактный гель может применяться в ультразвуковой терапии (фонофорезе). Действующие вещества геля дополняют лечебное действие ультразвуковых волн. Продолжительность терапии Препарат Долобене применяют в течение 7-10 дней или до исчезновения симптомов заболевания (боль, отёк, воспаление). В случае если в течение 10 дней лечения не наступает отчетливого улучшения необходимо обратиться к врачу. Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и тяжести заболевания.

Противопоказания

Не применяйте препарат Долобене: \- если у Вас аллергия на гепарин натрия, декспантенол, диметилсульфоксид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша); \- если у Вас бронхиальная астма; \- если у Вас тяжелые нарушения функции печени, почек; \- если у Вас выраженные нарушения сердечно-сосудистой системы; \- если Вы беременны или кормите грудью; \- у детей в возрасте до 5 лет; \- на открытых ранах в месте нанесения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Долобене проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Поскольку данные исследований по применению препарата Долобене у беременных женщин отсутствуют, его применение во время беременности противопоказано. Период кормления грудью Диметилсульфоксид проникает в грудное молоко, поэтому во время использования препарата Долобене следует прекратить кормление ребенка грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Серьезные нежелательные реакции Очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10000: \- реакции гиперчувствительности: крапивница (белые или красные, набухшие, зудящие высыпания на коже), отёк Квинке (быстрый отёк кожи, слизистых оболочек). При усилении нежелательных реакций, указанных выше, необходимо немедленно прекратить приём препарата и обратиться за медицинской помощью. Прочие нежелательные реакции Редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1000: \- запах чеснока изо рта. Запах вызван диметилсульфидом, являющимся продуктом метаболизма диметилсульфоксида. Очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10000: \- кожные реакции (покраснение, зуд, чувство жжения в месте нанесения геля), которые обычно исчезают во время дальнейшего лечения; \- изменение вкусовых ощущений, исчезающих через несколько минут после нанесения препарата; \- возможно возникновение тошноты, диареи, затруднения дыхания, головной боли, озноба при нанесении препарата на обширные участки тела. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы применили препарат Долобене больше, чем следовало необходимо немедленно обратиться к врачу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите вашему лечащему врачу или работнику аптеки о том, какие лекарственные препараты Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать. Местное применение других лекарственных средств с препаратом Долобене способствует усилению их проницаемости через кожу. При одновременном применении препарата Долобене и нестероидного противовоспалительного препарата сулиндак возможно развитие периферической нейропатии.

Особые указания

Место нанесения геля должно быть свободно от других лекарственных средств, косметики или любых химических средств. Долобене нельзя наносить на слизистые оболочки глаз, носа, рта, открытые раны или на поврежденные участки кожи (вследствие облучения, сильного солнечного ожога, послеоперационные рубцы). Во время лечения препаратом может усиливаться светочувствительность кожи, поэтому в период его применения следует ограничить интенсивные солнечные ванны и посещение солярия. В случае возникновения кожных реакций лечение должно быть прекращено. Из-за высокой абсорбции диметилсульфоксида не следует использовать Долобене в комбинации с другими мазями и гелями.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!