Инструкция по применению
Доппельгерц Актив Омега-3 800 мг Капсулы массой 1186 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: КВАЙССЕР ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 36.0



Описание

Физическая активность и здоровое питание являются необходимыми составляющими здорового образа жизни. Особенно важны для здоровья сердечно-сосудистой системы правильное питание, ограничивающее поступление в организм насыщенных жиров и холестерина, и оптимальное потребление полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3.   Многочисленными клиническими исследованиями показано, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 положительно влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы, а именно на: снижение липопротеинов низкой плотности и нормализацию соотношения холестерина и триглицеридов в крови, что очень важно в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклерозом. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 способствуют замедлению процессов тромбообразования, способствуют обеспечению поддержания иммунитета организма, нормализации мозгового кровообращения, улучшению памяти и обладают противовоспалительным действием. Витамин Е, содержащийся в составе Омега – 3, способствует предотвращению отложения холестерина в стенках сосудов, обеспечивает защиту клеток, предохраняет сердце от повреждений, связанных с дефицитом магния или с недостатком кислорода. Витамин Е также положительно влияет на состояние суставов. Таким образом, комплекс   полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и витамина Е очень важен для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза. * не превышает верхний допустимый уровень потребления ** адекватный уровень потребления

Состав

Рыбий жир из лосося, желатин, вода, глицерин (агент влагоудерживающий Е 422), DL-#-токоферол (витамин Е).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3 и витамина Е. Может применяться для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, возраст до 14 лет.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте