Инструкция по применению
Доппельгерц Актив Омега-3 + Q10 Капсулы массой 1625 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: КВАЙССЕР ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

ПНЖК Омега-3 – являются важными незаменимыми жирными кислотами для человеческого организма. Способствуют укреплению стенок сосудов и повышают их эластичность, улучшая тем самым их проходимость. ПНЖК Омега-3 положительно влияют на снижение липопротеинов низкой плотности, способствуют нормализации соотношения холестерина и триглицеридов в крови. Коэнзим Q10 – витаминоподобное вещество (убихинон), способствующее улучшению энергетического обмена, обладающее выраженными антиоксидантными свойствами. Убихинон поставляет в организм кислород и наделяет силой мышцы, в том числе и сердечную мышцу. Полезен при повышенных физических и умственным нагрузках. Витамин Е – является природным антиоксидантом. Оказывает благотворное влияние на кровообращение, снабжая организм кислородом. Способствует замедлению процесса старения клеток, защищает их от вредного воздействия внешней среды. Селен – природный антиоксидант, защищает клетки от повреждающего действия свободных радикалов. Недостаток селена может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. * - адекватный уровень потребления

Состав

Рыбный жир, желатин (загуститель), глицерин (агент влагоудерживающий Е 422), моно- и диглицериды жирных кислот (эмульгатор Е 471), сорбитовый сироп (подсластитель Е 420ii), коэнзим Q10, оксиды железа (краситель Е172), лецитин соевый (эмульгатор Е 322), dl-альфа токоферол (витамин Е), натрия селенит (селен).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, в том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, витамина Е, селена, источник коэнзима Q10.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Побочные действия

Содержит подсластитель-сахароспирт (сорбит), при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.