Инструкция по применению
Доппельгерц Эликсир энерготоник 250 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: КВАЙССЕР ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, ароматного запаха.

Состав

100 мл эликсира содержат:Активные компоненты:никотинамид - 25,0 мгтиамина гидрохлорид - 5,0 мгрибофлавин - 5,0 мгкальция пантотенат - 16,0 мгпиридоксина гидрохлорид - 5,0 мгцианокобаламин - 0,0035 мгфолиевая кислота - 0,3 мгрутозида тригидрат - 2,0 мгмарганца сульфата моногидрат - 0,1 мг (0,033 мг марганца)меди сульфата пентагидрат - 0,1 мг (0,025 мг меди)натрия глицерофосфат - 271,0 мгаммония железа цитрат (содержание железа 16,5-18,5%) - 200,0 мгхолина цитрат - 222,0 мгмед - 1200,0 мгсахарный сироп инвертный - 7360,0 мгомелы белой настойка (1:5) - 0,12 млзверобоя продырявленного травы настойка (1:5) - 0,20 млтысячелистника обыкновенного травы настойка (1:5) - 0,20 млбоярышника плодов настойка (1:5) - 0,60 млдудника корней настойка (1:5) - 0,175 млвалерианы лекарственной корневищ с корнями настойка (1:5) - 0,16 млхмеля соплодий настойка (1:5) - 0,16 млпомеранца кожуры настойка - 0,1625 млморская соль - 0,5 мгшалфея лекарственного листьев масло - 0,00002 млрозмарина листьев и стеблей масло - 0,00002 млмелиссы листьев масло - 0,00004 млароматическая настойка, приготовленная из: - 0,1625 млкоричного дерева кора - 2,67 мгимбиря корневища - 1,07 мгальпинии корневища - 0,53 мггвоздики бутоны - 0,53 мгкардамона плоды - 0,53 мгэтанола 70% v/v - 26,67 мгВспомогательные вещества: ликерное вино 88050,00 мг, краситель карамель (сахарный колер) Е 150 650,00 мг, ароматизатор сладкого вина 44,00 мг, этанол 96% v/v 52,43 мг, лимонной кислоты моногидрат 120,00 мг, ванилин 6,00 мг, очищенная вода 5640,00 мг.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

Для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, при интенсивных физических и умственных нагрузках, при повышенной потребности в витаминах и минеральных веществах после перенесенных заболевании и в послеоперационный период, в комбинированной терапии хронических заболеваний для улучшения самочувствия, при несбалансированном и неполноценном питании, для повышения работоспособности и улучшения концентрации внимания.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать внутрь по 20 мл (2 десертные ложки) 3-4 раза в день после еды. Рекомендуемый курс лечения 2-3 недели.

Противопоказания

Эпилепсия, хронический алкоголизм, заболевания головного мозга, черепно-мозговая травма, нарушения функции печени и/или почек, повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый период инфекционных заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, повышенное содержание железа в организме, нарушение всасывания железа, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, повышенная чувствительность кожи к свету, особенно у людей со светлой кожей.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Пиридоксин повышает декарбоксилирование леводопы в периферических тканях. Метотрексат, триметоприм, пириметамин, триамтерен, сульфасалазин, противоэпилептические лекарственные средства снижают абсорбцию фолиевой кислоты (дефицит фолатов).Бигуаниды уменьшают всасывание цианокобаламина. Фторурацил, винбластин, блеомицин, цисплатин нарушают усвоение витаминов B1, B6. Пеницилламин, изониазид снижают эффективность витамина B1, увеличивая его выведение. Изониазид снижает эффективность пиридоксина.Пероральные контрацептивы (эстрогены) снижают концентрацию в сыворотке крови фолиевой кислоты.Тетрациклины, несистемные антациды снижают абсорбцию железа.

Особые указания

Препарат содержит 15 об.% этанола. При соблюдении рекомендуемых дозировок при каждом приеме препарата в организм поступает до 2,5 г этанола, в максимальной суточной дозе препарата содержится до 10 г этанола.Вследствие наличия в составе препарата солей железа возможно окрашивание стула в черный цвет.В процессе хранения, в связи с содержанием в препарате природных компонентов, возможны небольшие отклонения в цвете и вкусе эликсира, что не оказывает влияния на терапевтическое действие препарата.Указания для больных сахарным диабетом: 20 мл (разовая доза) препарата соответствуют 0,32 хлебных единиц.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При применении препарата следует воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в месте, недоступном для детей.