
Инструкция по применению
Доппельгерц V.I.P. Кардио Омега Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: КВАЙССЕР ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 36.0



Описание

Доппельгерц® V.I.P. Кардио Омега - комплекс, состоящий из полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, полученных из арктических лососевых рыб, и комбинации витаминов Е, В6, В12 и фолиевой кислоты, полезных для поддержания жизнедеятельности сердца. Эти компоненты обладают антиоксидантным, гиполипидемическим, мембраностабилизирующим действием, снижают уровень общего холестерина и триглицеридов, улучшают соотношение между липопротеинами высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП). Антиатеросклеротические возможности Омега-3 неоднократно подтверждались в клинических исследованиях. Входящие в состав комплекса полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и витамины оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. 1 капсула содержит: ПНЖК Омега-3 не менее 340 мг, в том числе: эйкозопентаеновая кислота 200 мг, докозагексаеновая кислота 120 мг витамин Е 10 мг витамин В6 3 мг фолиевая кислота 300 мкг витамин В12 3 мкг В настоящее время в числе основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, является гипертриглицеридемия. Высокий уровень триглицеридов способствует развитию атеросклероза и формированию тромбов из-за повышения вязкости крови. Чем выше уровень триглицеридов в крови, тем ниже содержание «полезного» холестерина липопротеидов высокой плотности, который предотвращает образование атеросклеротических бляшек. Известно, что снижение уровня триглицеридов замедляет прогрессирование атеросклероза. Поэтому прием средств, влияющих на повышенное содержание триглицеридов, является одним из необходимых

мероприятий для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. БАД к пище «Доппельгерц® V.I.P. Кардио Омега», содержит повышенное количество ПНЖК Омега-3, которое способно влиять на уровень триглицеридов и общего холестерина в крови, на концентрацию ЛПВП и ЛПНП, оказывая полезное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 - к ним относятся эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота, которые присутствуют, в основном, в рыбе арктических морей, а также в небольших количествах могут синтезироваться в организме из альфа-линоленовой кислоты. ПНЖК Омега-3 необходимы для нормальной работы сердца, поддержания баланса между уровнем холестерина и триглицеридов в крови, снижают риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют нормальному функционированию клеток мозга и иммунной системы. Витамин Е - обладает выраженным антиоксидантным действием, улучшает снабжение сердечной мышцы кислородом, участвует в тканевом дыхании, улучшает регенерацию поврежденных клеток. Уменьшает отложение холестерина в стенках сосудов. Фолиевая кислота - принимает активное участие в регуляции функций органов кроветворения, необходима для формирования эритроцитов и метаболизма белков, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Витамин В6 (пиридоксин) - участвует во многих биохимических реакциях, в процессах возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Витамин В12 (цианокобаламин) - необходим в процессе кроветворения, играет важнейшую роль в функционировании нервной системы. Участвует в метаболизме гомоцистеина - фактора развития атеросклероза, тем самым снижая риск его развития. Важное значение имеет способность цианокобаламина регулировать функцию кроветворных органов. Пищевая и энергетическая ценность: 1 капсула содержит 45 кДж/10 ккал; белки 0,3 г, жиры 0,1 г, углеводы 0,1 г. Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц.

Состав

Рыбный жир из лосося, раствор желатина, моно- и диглицериды жирных кислот (эмульгатор Е 471), DL-#-токоферол (витамин Е), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12), рибофлавин (краситель Е 101i), титана диоксид (краситель Е 171), фолиевая кислота.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3 (в том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты), витамина Е, фолиевой кислоты, витаминов В6, В12.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременным и кормящим женщинам, возраст до 14 лет.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте