Инструкция по применению
Дормикинд Таблетки гомеопатические 150 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60.0



Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1таблетка содержит:Активные вещества: Cypripedium parviflorum var. pubescens (Cypripedium pubescens) D4 15 мг, Magnesium carbonicum D10 20 мг, Zincum valerianicum D12 15 мг.Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 29,85 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 15 мг, тальк - 5 мг, магния стеарат - 0,15 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Дормикинд не предоставлены.

Показания

Для лечения беспокойства и нарушений сна (трудности засыпания, беспокойный сон) у детей в возрасте до 6 лет.

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. При лечении грудных детей и детей раннего возраста таблетки можно растворять в 5 мл (1 чайная ложка) воды.При отсутствии иных указаний Дормикинд следует назначать детям в возрасте от 0 до 6 лет по 1 таб. 4 раза/сут. Максимальный курс лечения препаратом составляет 4 недели.При отсутствии улучшения на фоне применения препарата в течение 14 дней или при появлении нежелательных явлений следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Лекарственный препарат не применяется у данной категории пациентов.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости.При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

На настоящий момент информация о взаимодействии препарата Дормикинд с другими лекарственными средствами отсутствует.Если ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие препараты, в т.ч. те, которые можно приобрести без рецепта, то следует сообщить об этом врачу.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных препаратов может отмечаться временное обострение симптомов, в этом случае следует обратиться к врачу.При отсутствии терапевтического эффекта в течение 14 дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу.Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (4 таб.) соответствует 0,026 хлебной единицы (ХЕ).Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенной концентрации вниманияПрепарат применяется только у детей.

Условия хранения

В сухом месте