Инструкция по применению
Дормиплант Таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Германия
Производитель: Dr. Willmar Schwabe
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 160 мг+80 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт

Состав

Сухой экстракт корневищ с корнями валерианы (3-6:1)* 160 мг;Сухой экстракт листьев мелиссы (4-6:1)** 80 мг;* Экстрагент: этанол 62%.; ** Экстрагент: этанол 30%.; Вспомогательные вещества: сахароза - 2.5 мг, кросповидон - 15 мг, масло касторовое гидрогенизированное - 23 мг, кремния диоксид коллоидный - 11 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 67 мг, магния стеарат - 1.5 мг.; Состав оболочки: гипромеллоза - 20.08 мг, целлюлоза- микрокристаллическая - 2.51 мг, стеариновая кислота - 2.51 мг, титана диоксид (Е171) - 2.421 мг, лак индигокарминовый (Е132) - 1.639 мг, тальк - 0.46 мг, ванилин - 0.282 мг, натрия сахаринат - 0.049 мг, пеногасящая эмульсия в пересчете на сухое вещество - 0.049 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Растительные экстракты валерианы и мелиссы содержат большое количество биологически активных веществ, которые в совокупности определяют их фармакологическую активность. Поэтому данные о фармакокинетике отдельных химических компонентов, входящих в состав экстрактов, недостаточны для экстраполяции на препарат в целом.

Показания

— повышенная нервная возбудимость; — бессонница (трудности при засыпании).

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Время приема препарата не зависит от времени приема пищи.; При отсутствии других назначений лечащим врачом необходимо придерживаться инструкции по применению препарата Дормиплант.; При бессоннице (трудностях при засыпании): взрослым и детям старше 6 лет принимать по 2 таб. за 30 мин до сна.; При повышенной нервной возбудимости: взрослым и детям старше 6 лет принимать по 2 таб. утром и вечером. Курс лечения до 1.5-2 мес.

Противопоказания

— печеночная недостаточность; — детский возраст до 6 лет; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.; Со стороны ЖКТ: частота неизвестна - тошнота, абдоминальные боли.

Передозировка

Корень валерианы в дозе приблизительно 20 г может вызывать неопасные симптомы: усталость, брюшные колики, ощущение тяжести в области грудной клетки, головокружение, тремор рук и расширение зрачков, которые исчезают через 24 ч после отмены препарата.; Лечение: если симптомы сохраняются, рекомендуется проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС, а также алкоголя.

Особые указания

При отсутствии терапевтического эффекта на фоне приема препарата в течение 2-3 недель следует проконсультироваться с врачом. Не следует применять препарат более 1.5-2 мес ежедневно.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;При применении препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

В сухом месте