# Инструкция по применению
# Доверин таблетки 40 мг 24 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин
Количество в упаковке: 24
Дозировка действующего вещества: 40 мг




## Описание

Таблетки желтого с зеленоватым оттенком цвета плоскоцилиндрические с фаской.

## Действующее вещество

Дротаверин

## Состав

Состав препарата: Активное вещество: дротаверина гидрохлорид - 40 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 63 мг, крахмал картофельный - 32 мг, магния стеарат-1 мг,тальк - 3 мг, метилцеллюлоза водорастворимая -1 мг.

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

Быстро и полно всасывается в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность при приеме внутрь близка к 100 %, период полуабсорбции-12 мин. Равномерно распределяется по тканям, проникает в гладкомышечные клетки. В основном выводится почками, в меньшей степени - с желчью. Не проникает через гематоэнцефалический барьер.

**Показания**

Спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта (холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, папиллит), -спазмы гладкой мускулатуры мочевого тракта (нефролитиаз.уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря). В качестве вспомогательной терапии: - при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, спазмы кардии и привратника, энтерит, колит, спастический колит с запором и слизистый колит с метеоризмом), - тензорная головная боль, - при гинекологических заболеваниях (дисменорея).

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым по 40-80 мг (1-2 таблетки) 2-3 раза в сутки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата, тяжелая почечная или печеночная недостаточность,тяжелая сердечная недостаточность (синдром низкого сердечного выброса), период лактации, детский возраст до 18 лет. Не следует принимать людям, страдающим непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией. С осторожностью - при артериальной гипотензии, выраженном атеросклерозе коронарных артерий, гиперплазии предстательной железы, глаукоме, в период беременности.

**Побочные действия**

Желудочно-кишечные нарушения (тошнота, запор), нарушения нервной системы (головная боль, головокружение, бессонница), сердечно-сосудистые нарушения (учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия), аллергические реакции (в том числе аллергический дерматоз).

**Передозировка**

Атриовентрикулярная блокада, остановка сердца, паралич дыхательного центра. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Специфического антидота не существует.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Усиливает эффект других спазмолитиков (в т.ч. м-холиноблокаторов), артериальную гипотензию, вызываемую трициклическими антидепрессантами, хинидином, прокаинамидом. Уменьшает спазмогенную активность морфина, противопаркинсонические свойства леводопы. Спазмолитическое действие дротаверина увеличивается при одновременном применении с фенобарбиталом.

**Срок хранения после открытия**

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

В сухом,защищенном отсвета месте. Хранить в недоступном для детей месте.