Инструкция по применению
Доктор Тайсс мазь от простуды эвкалипт 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Dr. Theiss Naturwaren
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Камфора+Сосны обыкновенной хвои масло+Эвкалипта прутовидного листьев масло
Количество в упаковке: 1

Описание

Бальзам эвкалиптовый от простуды Доктор Тайсс является комбинированным препаратом растительного происхождения, который способен к оказанию противовоспалительного, местнораздрожающего, отхаркивающего, антисептического, бронхолитического и противокашлевого действия.

Действующее вещество

Камфора+Сосны обыкновенной хвои масло+Эвкалипта прутовидного листьев масло

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Эвкалиптовое масло при приеме внутрь абсорбируется. Выделяется оно частично через выдыхаемый воздух и через мочу, которая принимает фиолетовый оттенок. Камфора метаболизируется в организме и выделяется в соединении с глюкуроновой кислотой с мочой. Небольшое количество камфоры выделяется в выдыхаемый воздух. Быстрый метаболизм и выдыхание (испарение) объясняется кратковременным эффектом камфары.Наблюдалась абсорбция отдельных активных компонентов масла сосновой хвои.

Показания

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, включая бронхит, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты и кашлем

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 3 лет мазь наносят на кожу спины и груди и втирают легкими массажными движениями, затем накрывают смазанное место хлопчатобумажным полотенцем, для сохранения тепла. Процедуру повторяют несколько раз в день, особенно на ночь.Ингаляционно. Взрослым. Готовят горячий раствор (в 1 л горячей воды, но не кипятка, растворяют 2 чайные ложки препарата) и проводят ингаляцию в течение 5-10 минут.Курс лечения – по рекомендации врача.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата- бронхиальная астма, коклюш, псевдокруп- спастичесткий кашель- для ингаляций при острой респираторной инфекции дыхательных путей, при острой пневмонии- повреждение кожных покровов, наличие кожных заболеваний в месте предполагаемого нанесения препарата- детский возраст до 3 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет достаточных данных при применение при беременности и в период грудного вскармливания .

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, бронхоспазм. В редких случаях — развитие судорог, обусловленных действием камфоры.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не наблюдались.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки, на поврежденную кожу, на лицо. Перед применением необходимо проверить на переносимость эвкалиптового масла больным.При заболеваниях, которые длятся более чем 3 - 5 дней, одышке, головной боли, лихорадке, гнойной/кровавой мокроте или гнойных/кровавых выделениях из носа пациентам необходимо срочно обратиться к врачу.Необходимо исключить контакт детей с участками кожи, обработанными мазью.