Инструкция по применению
Д-Р ТАЙСС МУЛЬТИВИТАМОЛ РАСТВОР ФЛ. 200МЛ

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Dr. Theiss Naturwaren
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачный раствор желтого цвета с персиковым запахом

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

100 г препарата содержат:активные компоненты:железа (II) лактат 10,0 мгвитамин A (ретинола пальмитат) 180 МЕвитамин Д3 (колекальциферол) 12,5 мкгвитамин B1 (тиамина гидрохлорид) 4,0 мгвитамин B2 (рибофлавина фосфат натрия) 5,0 мгвитамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 5,0 мгвитамин B12 (цианокобаламин) 2,5 мкгвитамин C (аскорбиновая кислота) 300,0 мгвитамин E (токоферола ацетат) 30,0 мгникотинамид 50,0 мгдекспантенол 25,0 мгвспомогательные компоненты:кремофор EL 500,0 мгпропиленгликоль 500,0 мглимонная кислота 300,0 мгкалия сорбат 100,0 мгперсиковый ароматизатор 80,0 мгсахарный сироп 50000,0 мгвода до 100000,0 мг

Форма выпуска

Раствор

Показания

Профилактика гиповитаминоза и дефицита железа у детей при:повышенных умственных и физических нагрузках,в период восстановления после перенесенных заболеваний,в период интенсивного роста и развития у детей.

Способ применения и дозы

Внутрь.детям от 2 до 4 лет по 1 чайной ложке 1-2 раза в день,детям от 4 до 6 лет по 1 десертной ложке 1-2 раза в день,от 7 лет и старше по 2 десертные ложки 1-2 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Детский возраст до 2-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и кормления грудью принимать после консультации с врачом и при соблюдении рекомендуемой ежедневной дозы.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.В связи с наличием в препарате железа, возможны запоры и окрашивание стула в черный цвет.

Передозировка

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировкеСимптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства.При случайной передозировке необходимо обратиться к врачу.Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не превышать рекомендованную дозировку.Не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки.Возможно, окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.При хранении возможно помутнение раствора, не влияющее на качество препарата. Перед употреблением рекомендуется взбалтывать.Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:Не оказывает влияния на занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, в том числе вождения автомобиля.

Срок хранения после открытия

3 года.Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25оС.Хранить в недоступном для детей месте.