
Инструкция по применению
Драмина Таблетки 50 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Хорватия
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дименгидринат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Действующее вещество

Дименгидринат

Состав

Действующее вещество: Дименгидринат (Dimenhydrinate)Концентрация действующего вещества (мг): 50

Форма выпуска

Таблетки

Показания

\- Морская и воздушная болезнь \- Профилактика и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных противоопухолевой терапией. \- Болезнь Меньера

Способ применения и дозы

Внутрь, перед едой: - морская и воздушная болезнь: дети с 3 до 6 лет – 1/4 - 1/2 таблетки 2-3 раза в сутки; дети с 7 до 12 лет – 1/2 - 1 таблетка 2-3 раза в сутки; дети старше 12 лет и взрослые – 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки; - профилактика и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных противоопухолевой терапией: дети с 3 до 6 лет – 1/4 - 1/2 таблетки 2-3 раза в сутки; дети с 7 до 12 лет – 1/2 - 1 таблетка 2-3 раза в сутки; дети старше 12 лет и взрослые – 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки; -болезнь Меньера: дети до 12 лет – 1/2 - 1 таблетка 2-3 раза в сутки; дети старше 12 лет и взрослые 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых не должна превышать 7 таблеток. Для профилактики кинетозов следует принимать 1-2 таблетки за 30 минут до поездки. Длительность применения препарата и возможность повторения курса лечения – по согласованию с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, эпилепсия, острые экссудативные и везикулярные дерматозы, детский возраст до 1 года, беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применяют дименгидринат при закрытоугольной глаукоме, нарушениях мочеиспускания, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, эпилепсией, у больных с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.В период лечения следует избегать употребления алкоголя.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПациентам, принимающим дименгидринат, следует избегать занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Побочные действия

При одновременном применении с седативными, снотворными средствами, антидепрессантами, этанолом усиливается угнетающее влияние на ЦНС.При одновременном применении дименгидринат может маскировать ототоксичность стрептомицина и, по-видимому, других антибиотиков группы аминогликозидов.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость, головная боль, общая слабость, усталость, нарушение концентрации внимания, беспокойство, нервозность, бессонница, редко – ослабление ночного и цветного зрения, затуманенность зрения, нарушение аккомодации. Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, снижение аппетита, тошнота, рвота. Со стороны респираторной системы: сухость слизистой оболочки носа и горла, сгущение бронхиального секрета. Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови: снижение артериального давления, тахикардия, гемолитическая анемия. Аллергические реакции: кожная сыпь, ангионевротический отек, бронхоспазм, редко - медикаментозный дерматит. Прочие: затруднение мочеиспускания. Обо всех случаях побочных явлений следует уведомить врача.