Инструкция по применению
Драполен Крем для наружного применения 55 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Великобритания
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цетримид
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Антисептическое и дезинфицирующее средство. Применяется для лечения и профилактики пеленочного дерматита, а также используется как средство первой помощи при небольших ожогах. * * Инструкция по медицинскому применению, РУ No 015134/01 от 10.06.2010

Действующее вещество

Цетримид

Состав

1 г крема содержит: Активных веществ: бензалкония хлорид 0.1 мг, цетримид 2 мг Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый - 100 мг, ланолин безводный - 20 мг, цетиловый спирт - 50 мг, поливакс GP 200 - 50 мг, хлорокрезол - 1 мг, кармозин (E 122) - 0.02 мг, вода очищенная - до 1000 мг.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания

Профилактика и лечение пеленочного дерматита, в качестве средства первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины и солнечные ожоги).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен только для наружного применения. Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста Перед применением препарата следует вымыть и высушить пораженную область. Для лечения при появлении первых признаков дерматита (покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи) крем наносят 3 или более раз в сутки, по мере необходимости, обычно при любой смене пеленок (подгузников, памперсов). С целью профилактики наносят на кожу, покрываемую пеленками или подгузниками (памперсами), особенно перед сном, когда ребенок может долгое время находиться в мокрых пеленках (подгузниках). Порезы, царапины и солнечные ожоги Крем наносят тонким слоем, при необходимости накладывают марлевую повязку. Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Побочные действия

При повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка

Неизвестно.

Взаимодействие с другими препаратами

Мыло и анионовые сурфактанты снижают эффективность препарата.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Если сыпь не исчезает в течение 48-72 ч, необходимо обратиться к врачу. Крем не следует наносить на инфицированные кожные покровы с нарушением их целостности.

Условия хранения

Беречь от детей