Инструкция по применению
Дриптан Таблетки 5 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Оксибутинин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 5 мг
Срок годности: 36



Действующее вещество

Оксибутинин

Состав

1 таблетка содержит: Активные вещества: оксибутинина гидрохлорид 5 мг.; Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 17.8 мг, лактоза - 153.3 мг, кальция стеарат - 1.9 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь Cmax достигается через 45 мин, величина концентрации пропорциональна применяемой дозе. T1/2 составляет 2 ч. У лиц пожилого возраста T1 /2 увеличивается.

Показания

Недержание мочи, обусловленное нестабильностью функции мочевого пузыря нейрогенного характера (гиперрефлексия детрузора, например, при рассеянном склерозе или spina bifida) либо идиопатической природы; ночной энурез у детей старше 5 лет (в виде монотерапии или в комбинации с другими лекарственными средствами).

Способ применения и дозы

Принимают внутрь. Взрослым - по 5 мг 2-3 раза/сут. У пожилых пациентов в начале лечения применяют по 2.5-3 мг 2 раза/сут, затем при необходимости постепенно повышают дозу до 5 мг 2 раза/сут.;Детям старше 5 лет - начальная доза 2.5-3 мг 2 раза /сут, при необходимости постепенно повышают дозу до 5 мг 2-3 раза/сут. При ночном энурезе последнюю дозу следует принимать непосредственно перед сном.

Противопоказания

Нарушение оттока мочи из мочевого пузыря, когда возможна преципитация задержанной мочи; кишечная непроходимость; атония кишечника; тяжелый язвенный колит; расширение ободочной кишки; миастения; глаукома; лактация (грудное вскармливание); детский возраст до 5 лет; повышенная чувствительность к оксибутинину.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности оксибутинин применяют только по строгим показаниям, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.; Оксибутинин противопоказан к применению в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: возможны сухость во рту, тошнота, запор, дискомфорт в абдоминальной области, диарея.;Со стороны ЦНС: возможны головная боль, сонливость, головокружение, снижение остроты зрения.;Дерматологические реакции: возможны сухость кожных покровов.;Прочие: возможны приливы (чаще у детей), затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, аритмии.

Передозировка

Симптомы: возбуждение ЦНС (беспокойство, тремор, повышенная нервная возбудимость, судороги, бред, галлюцинации), лихорадка, тошнота, рвота, тахикардия, снижение АД, дыхательная недостаточность, паралич, кома.; Лечение: следует поддерживать дыхание, вызвать рвоту или провести промывание желудка, назначить активированный уголь и солевое слабительное. Для регрессии симптомов антихолинергической интоксикации используют блокаторы холинэстеразы (физостигмин). При выраженном беспокойстве или возбуждении — в/в введение 10 мг диазепама. При тахикардии — пропранолол (в/в).

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с лекарственными средствами, оказывающими антихолинергическое действие, возможно его усиление.;При одновременном применении итраконазол повышает концентрацию оксибутинина в плазме крови.

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста, при НЦД, нарушениях функции печени или почек, тиреотоксикозе, аритмии, ИБС, хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, начальных проявлениях доброкачественной гиперплазии предстательной железы, НЯК, у пациентов с илеостомой, колостомой, а также грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, сопровождающейся рефлюкс-эзофагитом.;Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;С осторожностью применяют у пациентов, деятельность которых требует повышенной концентрации внимания, высокой скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей