Инструкция по применению
Дротаверин Биосинтез Таблетки 40 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин
Количество в упаковке: 20



Описание

Таблетки желтого с зеленоватым оттенком цвета, круглой формы двояковыпуклые.

Действующее вещество

Дротаверин

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: дротаверина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) 40 мг Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный), кальция стеарат, карбоксиметилкрахмал натрия (примогель), крахмал картофельный.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При пероральном приеме абсорбция высокая период полуабсорбции 12 мин. Биодоступность 100 %. Равномерно распределяется по тканям проникает в гладкомышечные клетки. Время достижения максимальной концентрации в крови 2 часа. Связь с белками плазмы 9598 %. В основном выводится почками в меньшей степени с желчью. Не проникает через гематоэнцефалический барьер.

Показания

Спазм гладких мышц внутренних органов (почечная колика желчная колика кишечная колика дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря по гиперкинетическому типу холецистит постхолецистэктомический синдром). В составе комбинированной терапии: пилороспазм гастродуоденит язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки спастические запоры спастический колит проктит тенезмы пиелит. Тензорная головная боль. Дисменорея угрожающий выкидыш угрожающие преждевременные роды. При проведении некоторых инструментальных исследований холецистографии.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают внутрь по 4080 мг (1-2 таблетки) 2-3 раза в сутки детям старше 12 лет: по 40 мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки.

Противопоказания

Гиперчувствительность выраженная печеночная и почечная недостаточность период лактации детский возраст до 12 лет дефицит лактазы непереносимость лактозы глюкозогалактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Головокружение головная боль бессонница сердцебиение снижение артериального давления ощущение жара потливость тошнота запор аллергические кожные реакции.

Передозировка

Симптомы: в больших дозах нарушает предсердножелудочковую проводимость снижает возбудимость сердечной мышцы может вызвать остановку сердца и угнетение дыхательного центра. Лечение: пациент должен находиться под тщательным наблюдением врача и получать симптоматическое и поддерживающее лечение. Рекомендуется вызвать рвоту и/или промыть желудок.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении дротаверин может ослабить противопаркинсонический эффект леводопы. Усиливает действие папаверина бендазола и других спазмолитиков (в том числе мхолиноблокаторов) снижение артериального давления вызываемое трициклическими антидепрессантами хинидином и прокаинамидом. Уменьшает спазмогенную активность морфина. Фенобарбитал повышает выраженность спазмолитического действия дротаверина.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.