Инструкция по применению
Дротаверин-Озон Таблетки 40 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 40 мг

Описание

Относится к спазмолитическим препаратам миотропного действия. Расширяет кровеносные сосуды и снижает тонус гладких мышц мочеполовой и желчевыводящей системы, органов желудочно-кишечного тракта и перистальтику кишечника. Улучшает поступление кислорода в органы и ткани. Имеет большую эффективность и продолжительность действия по сравнению с папаверином, с которым схож по фармакологическому действию и химической структуре. Равномерно распределяется в тканях и оказывает вазодилатирующее действие.

Действующее вещество

Дротаверин

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и лечение функциональных нарушений и болевого синдрома, вызванных спазмом гладкой мускулатуры (в т. ч. спазмы ЖКТ, мочевыводящих путей, связанные с холелитиазом, холециститом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки. спазм пилорического и кардиального отдела желудка. спастические запоры, спастический колит. проктит, тенезмы. послеоперационные колики вследствие задержки газов. в связи с нефролитиазом, пиелитом). при проведении инструментальных исследований. спазмы периферических артерий, сосудов головного мозга. альгодисменорея. Для снижения возбудимости матки при беременности. при спазме зева матки в родах, затяжном раскрытии зева, послеродовых схватках, угрожающем аборте.

Способ применения и дозы

Внутрь - по 40-80 мг 1-3 раза/сут. Для детей в возрасте до 6 лет при приеме внутрь разовая доза составляет 10-20 мг, 6-12 лет - 20 мг, частота применения 1-2 раза/сут.

Противопоказания

Почечная недостаточность тяжелой степени, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая сердечная недостаточность (синдром низкого сердечного выброса), период лактации (грудного вскармливания), детский возраст (для парентерального применения), повышенная чувствительность к дротаверину.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, чувство жара. при в/в введении отмечены случаи снижения АД (вплоть до коллапса), развития AV-блокады, появления аритмий. Со стороны дыхательной системы: при в/в введении отмечены случаи угнетения дыхательного центра. Прочие: головокружение, усиление потоотделения.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами, хинидином, прокаинамидом усиливается снижение АД, вызываемое трициклическими антидепрессантами, хинидином и прокаинамидом. При одновременном применении уменьшается спазмогенная активность морфина. При одновременном применении с леводопой возможно уменьшение антипаркинсонического эффекта леводопы. При одновременном применении усиливается действие папаверина, бендазола и других спазмолитиков (в т. ч. м-холиноблокаторов). При одновременном применении с фенобарбиталом повышается выраженность спазмолитического действия дротаверина.

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов с выраженным атеросклерозом коронарных артерий, при артериальной гипотензии. Дротаверин может быть использован в составе комбинированной терапии для купирования гипертонического криза. Использование в педиатрииС осторожностью применять дротаверин (для приема внутрь) у детей. Парентеральное применени у детей противопоказано.