Инструкция по применению
Дульколакс суппозитории ректальные 10 мг 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Италия
Производитель: Istituto De Angeli
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 10мг
Срок годности: 5

Описание

Слабительное средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Бисакодил

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

В качестве слабительного средства в следующих случаях: запоры, обусловленные гипотонией толстой кишки (в т.ч. хронические), предоперационная подготовка, послеоперационное лечение, подготовка к инструментальным и рентгенологическим исследованиям, медицинские состояния, требующие облегчения дефекации.

Способ применения и дозы

Таблетки дульколакс взрослым и детям старше 12 лет при запорах, обусловленных гипотонией толстой кишки, для регулирования стула при геморрое, проктите, анальных трещинах назначают по 1-2 таблетки 1 раз в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 1 таблетке 1 раз в сутки. Дульколакс следует принимать на ночь или утром за 30 минут до приема пищи. При подготовке к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям дульколакс назначают по 2 таблетки на ночь за сутки до исследования и по 2 таблетки на ночь накануне операции или исследования. Таблетки дульколакса следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством жидкости. Ректальные свечи дульколакс назначают взрослым и детям старше 10 лет — по 1 свечи 1-2 раза в сутки. Детям в возрасте от 6 до 10 лет — по 1/2 свечи 1-2 раза в сутки. Детям младше 6 лет применять дульколакс можно только под медицинским контролем и по строгим показаниям. Свечи дульколакс вводят в прямую кишку заостренным концом вперед. Курс лечения дульколаксом 7 дней. Необходимость более длительной терапии определяет врач.

Противопоказания

Кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости (включая перитонит), острые заболевания органов брюшной полости, тяжелая дегидратация, кровотечение из ЖКТ, маточное кровотечение, спастический запоры, острый проктит, острый геморрой, цистит, карцинома толстой кишки (для ректальных свечей), возраст до 6 лет (для таблеток), повышенная чувствительность к препарату дульколакс.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует назначать дульколакс при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны спастические боли в животе, метеоризм, диарея, аллергические реакции. При передозировке дульколаксом возможна атония кишечника.

Особые указания

Необходимо избегать длительного приема дульколакса. Не следует принимать дульколакс в форме таблеток, покрытых оболочкой, одновременно с антацидами, щелочной минеральной водой или молоком.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.В сухом месте.