Инструкция по применению
Дуоденохель Таблетки для рассасывания гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60.0



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повышенной кислотностью.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Semecarpus anacardium (Семекарпус анакардиум) D4 30 мг, Argentum nitricum (Аргентум нитрикум) D6 30 мг, Cephaelis ipecacuanha (Цефалис ипекакуана) D4 30 мг, Iodum (Иодум) D6 30 мг, Lachesis mutus (Лахезис мутус) D12 60 мг, Petroleum rectificatum (Петролеум ректификатум) D6 60 мг, Robinia pseudoacacia (Робиния псеудоакация) D4 60 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Препарат применяют в комплексной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повышенной кислотностью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс лечения - 3-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом. В период обострений принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к йоду, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных. При заболеваниях щитовидной железы препарат следует принимать только после консультации с врачом. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.). Беречь от влажности! Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В сухом месте