Инструкция по применению
Дуопрост глазные Капли флакон 2,5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Румыния
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Латанопрост+Тимолол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.05 мг+5 мг/1 мл
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Латанопрост+Тимолол

Состав

Латанопрост 50 мкг, тимолол (в форме малеата) 5 мг, вспомогательные вещества: динатрия фосфат додекагидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, 1М раствор натрия гидроксида/хлористоводородной кислоты, натрия хлорид, бензалкониихлорид, вода очищенная

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Комбинированный противоглаукомный препарат понижает внутриглазное давление посредством уменьшения секреции водянистой влаги.Латанопрост – аналог простагландина F2a и селективный агонист FP рецепторов. Латанопрост снижает внутриглазное давление путем увеличения оттока водянистой влаги и оказывает противоглаукомное действие. Основной механизм действия латанопроста связан с увеличением увеосклерального оттока. Не оказывает достоверного влияния на продукцию водянистой влаги и не влияет на гематоофтальмический барьер.Тимолол – неселективный блокатор бета-адренорецепторов с незначительной внутренней СМА. При местном применении понижает внутриглазное давление за счет уменьшения образования водянистой влаги и небольшого увеличения ее оттока

Показания

Открытоугольная глаукома; повышение внутриглазного давления

Способ применения и дозы

Местно.Закапывают по 1 капле в глаз(а) 1 раз/сут. Если была пропущена одна доза, то в дальнейшем следует продолжать лечение, вводя следующую дозу как обычно.Если пациенту назначено более одного препарата для местного введения по поводу офтальмологического заболевания, то эти препараты следует вводить с интервалом не менее 5 минут.

Противопоказания

Бронхиальная астма или указание на бронхиальную астму в анамнезе, хроническая обструктивная болезнь легких;— синусовая брадикардия;— AV-блокада II-III степени; — декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность II-III степени;— кардиогенный шок;— возраст до 18 лет;— период кормления грудью;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью: воспалительная, неоваскулярная, закрытоугольная или врожденная глаукома, открытоугольная глаукома в сочетании с псевдофакией, пигментная глаукома (из-за отсутствия достаточного опыта применения препарата); афакия, псевдоафакия с разрывом задней капсулы хрусталика, пациенты с факторами риска макулярного отека (при лечении латанопростом описаны случаи развития макулярного отека, в т.ч. цистоидного).

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований по безопасности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.Препарат не следует назначать кормящим женщинам, либо следует отказаться от кормления грудью (тимолол, латанопрост и его метаболиты могут проникать в материнское молоко).

Побочные действия

Со стороны органа зрения: нарушение зрения, блефарит, катаракта, конъюнктивит, аллергические поражения конъюнктивы (в т.ч. фолликулы, папиллярные реакции конъюнктивы, точечные кровоизлияния), поражения роговицы (эрозии, пигментация, точечный кератит), нарушения рефракции, гиперемия глаза, раздражение глаза, боль в глазах, усиление пигментации радужки, кератит, фотофобия, выпадение участков полей зрения.Инфекции: синусит, инфекции верхних отделов дыхательных путей и другие инфекции.Нарушения метаболизма и питания: сахарный диабет, гиперхолестеринемия.Психические расстройства: депрессия.Со стороны нервной системы: головная боль.Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.Со стороны кожных покровов и подкожных тканей: гипертрихоз, сыпь и изменения кожи (раздражение, халазион).Со стороны костно-мышечной системы: артрит.

Передозировка

Симптомы: обусловленные латанопростом - раздражение глаз, конъюнктивальная или эписклеральная гиперемия, головокружение; обусловленные тимололом - головная боль, аритмия, брадикардия, бронхоспазм, тошнота, рвота.Лечение: немедленно промыть глаза водой или 0.9% раствором натрия хлорида, симптоматическая терапия

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение раствора Дуопрост вместе с блокаторами «медленных» кальциевых каналов, антиаритмическими средствами, бета-адреноблокаторами, сердечными гликозидами, холиномиметиками, наркотическими анальгетиками, ингибиторами МАО, средствами для снижения активности катехоламинов, может вызывать выраженную брадикардию или усиление его гипотензивного эффекта. Применение с эпинефрином изредка может вызывать мидриаз

Особые указания

Препарат может вызывать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужке, рекомендуется периодическое наблюдение лечащего врача. Препарат содержит консервант бензалкония хлорид, который может абсорбироваться контактными линзами и оказывать повреждающее действие на ткани глаза. Поэтому необходимо снять контактные линзы и вновь установить их через 15 мин после закапывания.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиЗакапывание глазных капель может вызывать транзиторное ощущение пелены перед глазами в течение нескольких минут, что необходимо учитывать при вождении автомобиля и работе с движущимися механизмами. Пока этот эффект не исчезнет, пациентам не следует управлять автомобилем или пользоваться сложной техникой

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении