Инструкция по применению
Дуовит Таблетки для женщин 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Прочие препараты
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Описание

Витамины Таблетки, покрытые оболочкой красного цвета: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой красного цвета. Минералы Таблетки, покрытые оболочкой голубого цвета: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой голубого цвета.

Действующее вещество

Поливитамины+Прочие препараты

Состав

1 таблетка содержит:Аскорбиновая кислота-50 мгТиамин-1,4 мгРибофлавин-2,0 мгНиацин-18 мгПантотеновая кислота-5,0 мгПиридоксин-1,4 мгКобаламин-1 мкгРетинол-800 мкгКальциферол-5 мкгАльфа-токоферол-10 мгБиотин-30 мкгФолиевая кислота-200 мкгЖелезо-14 мгЙод-150 мкгКальций-450 мгМагний-50 мгЦинк-15 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

В качестве профилактического средства при состояниях, сопровождающихся повышением потребности в витаминах и минералах: повышенная физическая нагрузка, в том числе в период активных занятий спортом, период грудного вскармливания, при нерегулярном, неполноценном питании или однообразном рационе питания.

Способ применения и дозы

Препарат Дуовит, рекомендуется принимать внутрь, после завтрака. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды. Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таблетке красного цвета и 1 таблетке голубого цвета один раз в сутки. Длительность приема препарата - 20 дней. Курс приема может быть повторен после перерыва (1-3 месяца) или по рекомендации врача.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующим веществам и/или к любому из вспомогательных веществ. Гипервитаминоз А и D. Почечная недостаточность. Одновременное применение с синтетическими ретиноидами. Наследственная непереносимость фруктозы, галактозы, дефицит лактазы, глюкозогалактозная мальабсорбция или сахаразно-изомальтазная недостаточность. Детский возраст до 12 лет. Беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Применение препарата Дуовит, при беременности противопоказано (из-за высокого содержания витамина А). Исследования на животных показали, что большие дозы витамина А оказывают тератогенное действие. Общая суточная доза витамина А (из всех источников, включая продукты питания) не должна превышать 3000 МЕ. Препарат Дуовит, не следует с применять с другими лекарственными средствами, содержащими витамин А, бета-каротин или синтетические аналоги витамина А - изотретиноин и этрететинат. Период грудного вскармливания В период грудного вскармливания препарат Дуовит, рекомендуется принимать по 1 таблетке красного цвета и 1 таблетке голубого цвета один раз в сутки. Витамин D выделяется в грудное молоко - это необходимо учитывать при грудном вскармливании и при получении витамина D из дополнительных источников.

Побочные действия

Нежелательные эффекты, которые могут возникать при применении препарата Дуовит,, классифицированы в следующие группы в порядке убывания частоты: очень часто (⩾ 1/10), часто (от ⩾ 1/100 до В каждой группе нежелательные эффекты представлены в порядке убывания серьезности. Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко - реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции. В этом случае необходимо отменить прием препарата и проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - желудочно-кишечные расстройства (например, боль в эпигастральной области, тошнота), особенно при приеме натощак. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: частота неизвестна - окрашивание мочи в ярко-желтый цвет вследствие наличия в препарате рибофлавина. В случае превышения рекомендуемых суточных доз могут наблюдаться следующие нежелательные эффекты: нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея (вследствие наличия маннитола и глицерола), рвота (вследствие наличия глицерола), нарушения со стороны нервной системы - головная боль (вследствие наличия глицерола). Препарат Дуовит, (таблетки красного цвета) содержит азокрасители (Е124 и El10), которые могут вызывать аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки при приеме препарата в рекомендуемых дозах не отмечено. При значительном превышении рекомендуемых доз возможны случаи гипервитаминоза А и D. Симптомы Симптомами передозировки витамина А после кратковременного приема больших доз витамина А являются боль в животе, анорексия, рвота, нечеткость зрения, головная боль, нарушение координации движений и покраснение кожи. Длительное применение высоких доз витамина А может вызывать истончение и зуд кожи, трещины на губах, воспаление конъюнктивы, боль в суставах, головную боль и рвоту. Симптомами передозировки витамина D, которые могут возникнуть после приема высоких доз витамина D, являются анорексия, потеря веса, утомляемость, дезориентация, рвота, запор или диарея, металлический привкус во рту, сухость слизистой оболочки полости рта и жажда. Симптомы передозировки витамина Е, которые могут возникнуть после приема высоких доз витамина Е, включают головную боль, утомляемость, тошноту, двоение в глазах, мышечную слабость, креатинурию легкой степени и желудочно-кишечные расстройства. Лечение Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое. В случае передозировки следует вызвать рвоту или промыть желудок (если с момента приема внутрь прошло немного времени).

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется принимать препарат Дуовит, одновременно с другими препаратами, содержащими витамины и минералы. Препарат Дуовит, содержит железо и кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также антимикробных средств - производных фторхинолонов. Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче). Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин, уменьшают всасывание железа. Поэтому при необходимости одновременного применения препарата Дуовит, и антацидных препаратов необходимо выдержать интервал между приемами не менее 3-х часов. При одновременном применении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии. Одновременное применение витамина В6 может уменьшать эффект леводопы, назначаемой при лечении болезни Паркинсона. Следует с осторожностью применять препараты, содержащие витамин Е, у пациентов, принимающих антикоагулянты или другие лекарственные средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов.

Особые указания

Не превышайте рекомендованную суточную дозу. При случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу. Перед одновременным применением витаминов, витаминно-минеральных и/или минеральных препаратов проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Одновременное применение препарата Дуовит, и синтетических ретиноидов не рекомендуется из-за возможности развития гипервитаминоза А. Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина. Специальная информация о вспомогательных веществах Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что каждая красная и голубая таблетка содержит около 0,9 г и 0,7 г сахара соответственно. Суточная доза препарата содержит 1,6 г сахара, что соответствует 0,16 хлебным единицам (ХЕ) (см. раздел "С осторожностью"). В 2-х таблетках препарата Дуовит, (1 таблетка красного и 1 таблетка голубого цвета) содержится около 331 мг лактозы моногидрата, 1094 мг сахарозы, 270 мг декстрозы (глюкозы) жидкой, 237 мг сорбитола, поэтому препарат противопоказан пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, дефицитом лактазы, глюкозогалактозной мальабсорбцией или сахаразно-изомальтазной недостаточностью. В препарате Дуовит, содержится глицерол, в связи с чем при передозировке возможны головная боль и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота). Препарат Дуовит, (таблетки красного цвета) содержит азокрасители (Е124 и Е110), которые могут вызывать аллергические реакции. Таблетки красного цвета содержат полиол (маннитол), который в высоких дозах может вызывать диарею.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:О влиянии препарата Дуовит, на способность управлять транспортными средствами и механизмами не сообщалось.

Условия хранения

В сухом месте