Инструкция по применению
Дуовит драже 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Драже
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 40

Описание

Драже, покрытые оболочкой красного цвета (витамины): круглые, двояковыпуклые драже, покрытые оболочкой красного цвета.Драже, покрытые оболочкой голубого цвета (минералы): круглые, двояковыпуклые драже, покрытые оболочкой голубого цвета.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 драже красного цвета (витамины) содержит:Активные вещества: - Ретинола пальмитат (витамин А) концентрат, синтетический,масляная форма (1,7 mioME/г) - 2,94 мгКолекальциферол (витамин D3) концентрат,масляная форма (1 mioME/г) - 0,20 мгАскорбиновая кислота (витамин С) - 60,00 мгТиамина мононитрат (витамин В1) - 1,00 мгРибофлавин (витамин В2) - 1,20 мгПиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 2,00 мгЦианокобаламин 0,1% в маннитоле(что соответствует 3 мкг витамина В12) - 3,00 мгНикотинамид (витамин РР) - 13,00 мгФолиевая кислота - 0,40 мгКальция пантотенат (витамин В5) - 5,00 мг#-токоферола ацетат (витамин Е) - 10,00 мгВспомогательные вещества: - Лактозы моногидрат - 180,00 мгАпельсина масло 05073 - 5,00 мгПолисорбат 80 - 0,50 мгГлицерол - 3,45 мгКасторовое масло, очищенное - 0,97 мгСорбитол - 131,00 мгДекстроза (глюкоза) жидкая,(сухое вещество) - 150,00 мгПеногаситель 1510 - 0,02 мгМагния стеарат - 2,50 мгКраситель Опалюкс AS-F-2833G(краситель пунцовый Понсо 4R Е124 + краситель солнечный закат желтый Е110) - 10,00 мгВоск эмульсионный - 2,50 мгСахароза - до1200,00 мг1 драже голубого цвета (минералы) содержит:Активные вещества: - Кальция гидрофосфат дигидрат(что соответствует кальцию Ca2+ 15 мг и фосфору P5+ 12 мг) - 64,50 мгЖелеза фумарат(что соответствует железу Fe2+ 10 мг) - 30,30 мгМеди сульфата пентагидрат(что соответствует меди Cu2+ 1 мг) - 4,00 мгЦинка сульфат гептагидрат(что соответствует цинку Zn2+ 3 мг) - 13,30 мгМагния лактат дигидрат(что соответствует магнию Mg2+ 20 мг) - 200,00 мгМарганца сульфат моногидрат(что соответствует марганцу Mn2+ 1 мг) - 3,10 мгНатрия молибдата дигидрат(что соответствует молибдату Mo6+ 0,1 мг) - 0,22 мгВспомогательные вещества:Лактозы моногидрат - 151,00 мгАпельсина масло 05073 - 5,00 мгПолисорбат 80 - 0,50 мгГлицерол - 3,45 мгКасторовое масло, очищенное - 0,97 мгСорбитол - 105,70 мгДекстроза (глюкоза) жидкая (сухое вещество) - 120 10 мгПеногаситель1510 - 0,02 мгМагния стеарат - 2,50 мгПарафин жидкий - 10,00 мгПовидон - 2,00 мгКраситель индигокарминAS-20912 (Е132) - 10,00 мгВоск эмульсионный - 2,50 мгСахароза - до 1200,00 мг

Форма выпуска

Драже

Показания

В качестве профилактического средства при состояниях, сопровождающихся повышением потребности в витаминах и минералах: повышенная физическая нагрузка, в том числе в период активных занятий спортом, период беременности и лактации, при нерегулярном, неполноценном питании или однообразном рационе питания.

Способ применения и дозы

Препарат рекомендуется принимать внутрь после завтрака.Взрослым и детям старше 10 лет по 1 драже красного цвета и 1 драже голубого цвета в сутки. Драже следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.Курс приема препарата 20 дней. Курс приема препарата может быть повторен после перерыва (1-3 месяца) или по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и лактации препарат можно применять по назначению врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, включая реакции гиперчувствительности с астматическим компонентом.

Передозировка

Случаев передозировки при приеме препарата в рекомендуемых дозах не отмечено. При значительном превышении рекомендуемых доз возможны случаи гипервитаминоза А и Д, головная боль, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея).

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также антимикробных средств - производных фторхинолонов.Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче).Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также холистерамин уменьшают всасывание железа. Поэтому при необходимости совместного назначения Дуовита® и антацидных препаратов необходимо выдержать интервал между приемами не менее 3-х часов.При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии. Не рекомендуется принимать Дуовит® совместно с другими препаратами, содержащими витамины и минералы.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет - совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.Пациентам, больным сахарным диабетом, необходимо знать, что каждая таблетка содержит 0,8 г сахара, а дневная доза препарата содержит 1,6 г сахара.В драже Дуовит® красного и синего цвета содержится 331 мг лактозы, 1083 мг сахарозы, 270 мг глюкозы, 237 мг сорбитола, поэтому не рекомендован пациентам с врожденной непереносимостью глюкозы и фруктозы, с синдромами мальабсорбции глюкозы/галактозы и дефицита сахарозы /изомальтозы.В препарате содержится глицерол, при передозировке возможны - головная боль и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота). Азо красители Е 124 и Е 110 могут вызвать реакции гиперчувствительности с астматическим компонентом. Реакции гиперчувствительности на препарат возможны у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.Драже красного цвета содержат полиол (маннитол), который в больших дозах может вызвать диарею.Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте.Хранить в недоступном для детей месте.