Инструкция по применению
Дышесол Капли назальные 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от синего до синего с зеленоватым оттенком цвета с характерным запахом.

Состав

Препарата (флакон) содержат:Активные компонентыСосны обыкновенной хвои масло (Сосны обыкновенной масло) - 0,3752 гВитамин Е (dl-альфа-Токоферола ацетат, Витамин Е-ацетат) - 0,1700 гМяты перечной листьев масло (Мяты перечной масло) - 0,1000 гЭвкалипта листьев масло (Эвкалиптовое масло) - 0,0500 гТимол - 0,0032 гГвайазулен - 0,0020 гВспомогательные веществаОлеоилмакроголглицериды / Олеоилполиоксил-глицериды (Лабрафил М-1944-CS) - 1,0000 гБутилгидроксианизол - 0,0012 гПодсолнечное масло (масло подсолнечное) - 8,2984 г

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Острый ринит, хронический атрофический ринит, острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистых оболочек носа, состояния после оперативного вмешательства в полости носа - по назначению врача (в условиях стационара и амбулаторно).

Способ применения и дозы

Местно. Взрослым препарат закапывают в первый день по 1-2 капли в каждый носовой ход с интервалами в 1-2 часа. В последующие дни по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. Детям закапывают по 1-2 капли 3-4 раза в день или используют ватный тампон.Возможно применение препарата для ингаляций, для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор.Ингаляции рекомендуется проводить 2-3 раза в день. Длительность лечения 5-7 дней. Увеличение продолжительности или проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с лечащим врачом. Если после лечения улучшение не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергический ринит, детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов приведена на основании системно-органных классов MedDRA (Медицинский терминологический словарь для регуляторной деятельности):Очень часто (⩾ 1/10),Часто (⩾1/100, но Нечасто (⩾ 1/1000, но Редко (⩾ 1/10000, но Очень редко (Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).Общие расстройства и нарушения в месте введенияЧастота неизвестна - зуд, жжение, сухость, гиперемия или отек слизистой оболочки носа.Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостенияЧастота неизвестна - дискомфорт в носу.Нарушения со стороны иммунной системыЧастота неизвестна - гиперчувствительность к лекарственному препарату.Если любые из указанных в инструкции побочных действий усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.Частое и/или длительное применение лекарственного препарата может привести к сухости слизистой оболочки носа. При состояниях послеоперационного вмешательства в полости носа препарат применяют только по назначению врача.Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмамиПрименение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке картонной) пи температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.